

NEURO - BIOM

انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم | شماره هشتم_ پاییز ۱۴۰۴



جامع‌ترین نشریه علمی دانشجویی

در حوزه علوم اعصاب

نشریه علمی دانشجویی بیوم

BIOM SCIENTIFIC-STUDENT JOURNAL

Biom

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

کارشناس علمی

دکتر رضا شیخ اکبری مهر
(دکتری سیستماتیک گیاهی، عضو هیئت
علمی گروه زیست شناسی دانشگاه قم)

استاد مشاور

دکتر ابراهیم چراغی
(دکتری تخصصی علوم جانوری - گرایش
سلولی تکوینی، عضو هیئت علمی گروه
زیست شناسی دانشگاه قم)

سر دبیر و مدیرمسئول

محمد خانی دمنه

مدیر اجرایی

محمد علی حیدری

سرپرستان هیئت تحریریه

محمد خانی دمنه (بخش جهان جانوری - زیست شناسی نوین)
زهرا موحدی فر (بخش ژورنال کلاب - نوروساینس بالینی)
معصومه جلمبادانی (بخش فرگشت - تنوع و حفاظت)
زینب زارعی (بخش ذره بین)

طراح و گرافیکست

محمد کاظمی

نشانی:

قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه
قم دانشکده علوم پایه - گروه زیست شناسی

ارتباط با ما

شناسه نشریه ۱۹۳۴۵ / ۱۴۰۱ / د

Biosociety



Biom.mags@gmail.com



بیوم

هیئت تحریریه به تفکیک هر بخش

ژورنال کلاب

زهرا یارمحمدی - دکتری زیست شناسی سلولی تکوینی
مهتاب رازی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
آرمین اهنگری - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

ذره بین

معصومه حامدفر - کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
زهرا موحدی فر - کارشناسی زیست شناسی جانوری
راحله نجف پور - کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
فاطمه جوانبخت - دانشجوی پرستاری
محیا رادمان مهر - کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
مبینا کاشکی - کارشناسی علوم آزمایشگاهی
شمیلا شاطرزاده - کارشناسی بیوتکنولوژی
حدیث بهارلو - کارشناس میکروبیولوژی

ویراستاران علمی

سید محمدسجاد سجادی (پژوهشگر حوزه ناباروری)
دکتر فاطمه خسروی (دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری)
دکتر احمدرضا صحرانورد (دکتری میکروبیولوژی)

ویراستاران ادبی

نازنین زهرا بنائی - کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
فاطمه طبیب زاده - کارشناسی زیست شناسی جانوری
محمد خانی دمنه - کارشناسی زیست شناسی جانوری

فرگشت

محمدعلی حیدری کارشناسی - ارشد نانوبیوتکنولوژی
محمدحسن احمدی آدینه لو - کارشناس زیست شناسی جانوری
عرفان عجم زاده - کارشناسی زیست شناسی جانوری

جهان جانوری؛ از ژن تا رفتار

شیرین طائب - کارشناسی میکروبیولوژی
سمیرا مظفری - دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
فاطمه خسروی - دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری
مریم اوصانلو - کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی
حانیه شریفی - کارشناسی ارشد ژنتیک
فاطمه سادات مجلسی - کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

زیست شناسی نوین

ریحانه مهرعلی - کارشناسی مهندسی پزشکی
علی مومنی - کارشناسی بیوتکنولوژی
محمد حسن محمدی یگانه - کارشناسی مهندسی کامپیوتر
حسین یوسفی - کارشناسی بیوتکنولوژی
فاطمه حق بین - کارشناسی سلولی مولکولی

نوروساینس بالینی

سپیده عارف - ارشد نانوبیوتکنولوژی
ریحانه مومنی فر - کارشناسی میکروبیولوژی
معصومه جلمبادانی - کارشناسی زیست شناسی جانوری

تنوع و حفاظت

نسترن عالمی - کارشناسی ارشد انگل شناسی
فاطمه شریف بیگی - کارشناسی بیوتکنولوژی
معصومه حیدری - کارشناسی میکروبیولوژی

در زمانه حاضر، که دانش زیست‌شناسی نقشی اساسی در شناخت حیات و پدیده‌های طبیعی ایفا میکند، ضرورت ترویج نگاه علمی و پژوهش‌محور در میان دانشجویان بیش از پیش احساس میشود. در این مسیر، نشریات علمی دانشجویی جایگاهی ارزشمند دارند؛ چرا که زمینه‌ای برای بروز اندیشه، شکوفایی خلاقیت و تبادل علمی میان نسل جوان فراهم میسازند.

نشریه "بیوم"، حاصل تلاش و همدلی جمعی از دانشجویان پرتلاش انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه قم است؛ تلاشی درخور تحسین برای گسترش فرهنگ علمی، تقویت مهارت‌های پژوهشی و تبیین تازه‌ترین مباحث زیست‌شناسی. انتشار چنین نشریه‌ای نه تنها نشانه پویایی علمی در میان دانشجویان است، بلکه پلی است میان آموزش، پژوهش و جامعه علمی گسترده‌تر، نشانه‌ای از زنده بودن فضای علمی دانشگاه و باور به توانایی‌های نسل نو. هر شماره از «بیوم»، گامی کوچک اما مؤثر در مسیر بلند گفت‌وگو، یادگیری و شکوفایی استعدادهای زیستی جامعه به شمار می‌آید.

شناخت مغز و سازوکارهای پیچیده‌ی آن، از شگفت‌انگیزترین و در عین حال دشوارترین مسیری است که علم زیست‌شناسی تاکنون پیموده است. از فرگشت و تکامل اولیه ساختارهای عصبی تا شکل‌گیری حافظه، خواب و رویا در موجودات زنده، هر گام در این راه دریچه‌ای تازه به رازهای آفرینش می‌گشاید. شماره هشتم نشریه بیوم با تمرکز بر دنیای گسترده‌ی علوم اعصاب، کوششی است برای نزدیک‌تر شدن به این جهان پررمز و راز. در این شماره، موضوعاتی چون تکوین عصبی در دوران جنینی، مدل‌سازی محاسباتی مغز، فناوری‌های نوین تصویربرداری عصبی، و کاربردهای بالینی نوروساینس مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نگاهی به مفهوم تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از آن، یادآور می‌شود که شناخت حیات، تنها در گرو بررسی ساختار مغز نیست، بلکه در پیوند عمیق آن با زیست‌بوم و دیگر اشکال زندگی معنا می‌یابد.

آنچه این نشریه را ارزشمند می‌سازد، پشتکار و انگیزه والای دانشجویانی است که با عشق به علم و کنجکاوی علمی، محتوایی درخور جامعه دانشگاهی فراهم کرده‌اند. "بیوم" نماد پویایی و اندیشه‌ورزی دانشجویان زیست‌شناسی دانشگاه قم و همراهی دانشجویان و دانش‌آموختگان دیگر مراکز علمی کشور است؛ تلاشی است برای پیوند میان آموزش، پژوهش و خلاقیت.

به عنوان همکار علمی این مجموعه، از زحمات تمامی اعضای تحریریه و نویسندگان ارجمند قدردانی می‌کنم و امیدوارم این مسیر پربار همچنان با انگیزه، دقت و امید ادامه یابد.

با آرزوی توفیق روزافزون

دکتر رضا شیخ اکبری مهر

عضو هیئت علمی گروه زیست‌شناسی
دانشگاه قم و همکار علمی نشریه بیوم



با درود به جامعه علمی و دانشجویی فرهیخته

با کمال افتخار اعلام می‌کنم که نهمین شماره فصلنامه علمی- دانشجویی بیوم، با نام اختصاری "NEUROBIOM" و با محوریت علوم اعصاب (نوروساینس) منتشر شد. این شماره حاصل همکاری ارزشمند دانشجویان علوم زیستی و علوم پزشکی سراسر کشور است و نمادی از هم‌افزایی علمی و تفکر میان‌رشته‌ای در جامعه دانشجویی به شمار می‌آید.

علوم اعصاب به عنوان یکی از پیشروترین و پویاترین حوزه‌های علمی روز، نقشی اساسی در درک عملکرد مغز، شناخت رفتار انسان و توسعه فناوری‌های نوین ایفا می‌کند. از بررسی سازوکارهای عصبی و درمان بیماری‌های مغزی گرفته تا الهام‌بخشی در زمینه‌های هوش مصنوعی و علوم شناختی، این علم پلی میان زیست‌شناسی، پزشکی، روان‌شناسی و مهندسی ایجاد کرده و هر روز افق‌های تازه‌ای را پیش روی پژوهشگران می‌گشاید.

در یک سال گذشته، نشریه بیوم مسیر رشد و بلوغ علمی چشمگیری را پیموده است. انتشار منظم و دقیق چهار شماره فصلنامه اصلی، تهیه و انتشار ویژه نامه‌های مرتبط با رویدادهای زیستی، ارتقای کیفی محتوای علمی و گرافیکی، گسترش همکاری‌های میان‌رشته‌ای و افزایش چشمگیر جامعه مخاطبان در میان دانشجویان، اساتید و پژوهشگران سراسر کشور از جمله دستاوردهای برجسته این دوره بوده است.

بی‌تردید، این موفقیت حاصل تلاش صادقانه و روحیه علمی والای اعضای تحریریه و کارگروه‌های تخصصی است؛ تیمی که با خلاقیت، دقت علمی و مسئولیت‌پذیری بالا، مسیر پیشرفت بیوم را هموار کرده و آن را به یکی از نشریات علمی- دانشجویی پیشرو در حوزه علوم زیستی تبدیل ساخته است.

اکنون با انتشار شماره جدید نشریه بیوم، دوره کنونی مدیریت و سردبیری بنده در این نشریه به پایان می‌رسد. با اطمینان خاطر، مسئولیت بیوم را به تیم جدید می‌سپارم؛ تیمی توانمند و نوگرا که یقین دارم با انرژی تازه، ایده‌های خلاقانه و تعهد علمی خود، مسیر رشد این نشریه را ادامه خواهد داد و جایگاه آن را به عنوان مرجع علمی دانشجویی در حوزه علوم زیستی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

در این مسیر، وظیفه خود می‌دانم از اساتید گران قدر هیئت علمی دانشگاه قم، به‌ویژه جناب آقای دکتر ابراهیم چراغی، دکتر رضا شیخ‌اکبری مهر و دکتر مرتضی یوسف‌زادی، که با راهنمایی‌ها و حمایت‌های ارزشمند خود نقش مؤثری در رشد و پیشرفت نشریه داشتند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. همچنین از معاونت فرهنگی دانشگاه قم و جناب آقای حمیدی، مسئول محترم نشریات دانشگاه، برای پشتیبانی‌های مستمر و سازنده ایشان قدردانی ویژه دارم. نشریه بیوم، با تکیه بر تجربه‌های گذشته و امید به آینده، همچنان پویا، خلاق و متعهد به ترویج علم و ارتقای فرهنگ پژوهش در میان دانشجویان باقی خواهد ماند.


"آینده از آن بیوم است"

با سپاس و احترام؛ محمد خانی دمنه
سردبیر و مدیرمسئول نشریه علمی- دانشجویی بیوم


26 آنزیم‌های ترمیم‌کننده DNA؛ سپری در برابر اختلالات مغزی
 بررسی نقش آنزیم‌های ترمیم‌کننده DNA در محافظت از نورون‌ها و پیشگیری از بیماری‌های عصبی ناشی از آسیب ژنتیکی

31 رازهای فعالیت مغز در خواب REM

مروری بر الگوهای فعالیت مغزی در مرحله خواب REM و نقش آن در رؤیا، حافظه و سلامت عصبی



زیست‌شناسی نوین >



فرگشت >

2 مکامل مغز چگونه انگشت شست ما مغز را بزرگ‌تر کرد؟

بررسی ارتباط مهارت‌های دستی پیشرفته و استفاده از ابزار با رشد و پیچیدگی مغز در نخست‌ها

6 مغز و تنوع زیستی: چرا مغز حیوانات متفاوت است، اما همه برای بقا؟

بررسی چگونگی تطابق مغزهای متفاوت حیوانات با محیط‌های زیستی گوناگون برای بهبود بقا کاوش مفهوم تنوع در تکامل و چگونگی سازگاری مغزها با محیط‌های مختلف

10 انتخاب طبیعی و حافظه: چرا به یاد آوردن گذشته برای بقا مهم است؟

تحلیل نقش حافظه در فرایند انتخاب طبیعی و چگونگی ذخیره درس‌های بقا در خاطرات

35 تصویربرداری عصبی نسل جدید fMRI - با وضوح بالا و نورون‌نگاری سه‌بعدی چه اسراری را فاش می‌کند؟

معرفی تکنولوژی‌های پیشرفته تصویربرداری مغزی و قابلیت‌های نوین آن در بررسی عملکرد مغز

38 هوش مصنوعی از مغز الهام می‌گیرد یا برعکس؟

بررسی تعامل بین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دانش مغز، و تأثیر متقابل این دو حوزه

41 نسل نوین نوروساینس: تراشه‌ها، بازتوانی و فراتر از محدودیت‌های مغز

توضیح تکنولوژی‌های نوین در بازتوانی مغز و استفاده از تراشه‌های عصبی برای افزایش عملکرد

45 روان‌گردان‌ها؛ از توهم تا درمان - چطور داروهای قدغن دوباره در علم زنده شدند؟

کاوش در نقش داروهای روان‌گردان در درمان بیماری‌های عصبی و روانی و بازگشت تحقیقات

45 مدل‌سازی محاسباتی مغز: شبیه‌سازی شبکه‌های عصبی بیولوژیکی با کمک الگوریتم‌های کامپیوتری.

بررسی چگونگی شبیه‌سازی نورون‌ها و شبکه‌های عصبی واقعی با استفاده از مدل‌های ریاضی و الگوریتم‌های کامپیوتری برای درک عملکرد مغز



جانوری >

14 نورون‌ها چگونه حرف می‌زنند؟ دنیای پنهان پیام‌رسانی عصبی

شرح فرآیندهای پیچیده انتقال سیگنال‌ها بین نورون‌ها و نقش آنها در عملکرد مغز

16 گلیا؛ قهرمانان گمنام مغز سلول‌هایی که بدون آن‌ها مغز از کار می‌افتد


معرفی نقش‌های حیاتی سلول‌های گلیا در حمایت، تغذیه و حفاظت از نورون‌ها

19 مغز در حال ساختن خودش ماجرای تکوین عصبی در دوران جنینی

توضیح مراحل رشد مغز از تشکیل نورون‌ها تا شکل‌گیری شبکه‌های عصبی در جنین

22 خواب و رویا؛ تمرین مغز برای بقا - چرا خوابیدن برای حافظه حیاتی است؟

بررسی نقش خواب در تثبیت حافظه، بازسازی مغز و آمادگی برای چالش‌های زندگی





ژورنال کلاب <



نوروساینس بالینی <

50 میکروبیوم روده و تاثیر بر مغز

نقش میکروب‌های روده در تنظیم عملکردهای مغزی و ارتباط آن با اختلالات عصبی

54 اختلالات عصبی ناشی از آلودگی هوا و محیط زیست

بررسی تاثیر آلودگی هوا و عوامل زیست‌محیطی بر سلامت مغز و افزایش خطر بیماری‌های عصبی

71 نوروساینس بیماری‌ها

تحلیل و مرور یک یا دو مقاله برجسته درباره بیماری‌های عصبی شایع و مکانیسم‌های آن‌ها (بستگی به مقدار محتوای متنی دارد)

76 الگوهای ژنتیکی در شکل‌گیری مغز جنینی

مطالعه نقش ژن‌ها و مسیرهای ژنتیکی در رشد و تکوین مغز در دوره جنینی

79 حالت‌های تغییر یافته آگاهی حالت‌های تغییر یافته آگاهی

بررسی اثر خواب، رویا، دژاوو، مواد روان‌گردان و مدیتیشن بر مغز و آگاهی (بررسی یک یا دو مورد از موارد ذکر شده و ارجاع به مقاله مربوطه)

58 نور مصنوعی و ریتم مغز: اثر آلودگی نوری در خواب انسان

تاثیر نورهای مصنوعی بر ریتم‌های شبانه‌روزی و پیامدهای آن بر کیفیت خواب و سلامت مغز



ذره بین <



تنوع و حفاظت <

61 اثرات آلودگی صوتی اقیانوس بر ارتباطات عصبی نهنگ‌ها

چگونگی تاثیر سروصدای مصنوعی در اقیانوس بر سیستم ارتباطی و عصبی نهنگ‌ها

82 بررسی مستند "MY BEAUTIFUL BROKEN BRAIN"

تحلیل مستند و آگاهی بخشی درباره تجربه‌ها و مسیرهای بازتوانی پس از سکته مغزی

55 گرمایش زمین و اختلالات ریتم شبانه‌روزی در گونه‌های قطبی

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر ریتم‌های زیستی و سلامت عصبی حیوانات مناطق قطبی

85 مروری بر کتاب "مردی که همسرش را با کلاه اشتباه گرفت" نوشته الیور ساکس

بررسی محتوای کتاب و پیام‌های علمی و انسانی آن درباره اختلالات عصبی

68 تغییرات اقلیمی و مغز حیوانات مهاجر

چگونگی تاثیر تغییرات محیطی بر مغز و توانایی‌های مسیریابی و حافظه حیوانات مهاجر

89 معرفی هنری مارکرام و پروژه "مغز آبی"

توضیح تکنولوژی‌های نوین در بازتوانی مغز و استفاده از تراشه‌های عصبی برای افزایش عملکرد



93 معرفی پژوهشگران ایرانی پیشرو در علوم نوروساینس و اعصاب

بررسی ارتباط مهارت‌های دستی پیشرفته و استفاده از ابزار بارش و پیچیدگی مغز در نخستی‌ها

96 اخبار و تازه‌های زیست‌شناسی

خلاصه مهم‌ترین پیشرفت‌ها و کشفیات نوین در علوم اعصاب طی سال اخیر

تایم لاین و اینفوگرافی <

99 گمایش مراحل خواب (REM و NREM) و فعالیت‌های مغزی در هر مرحله


تصویرسازی چرخه خواب و نقش هر مرحله در سلامت و حافظه

101 مراحل رشد جنینی و نوزادی مغز، شکل‌گیری شبکه‌ها، تمایز نورون‌ها و سیناپس‌ها

تصویرسازی چرخه خواب و نقش هر مرحله در سلامت و حافظه

102 تایم لاین تکامل مغز به ترتیب پیچیدگی در گونه‌های مختلف جانوری

تصویرسازی چرخه خواب و نقش هر مرحله در سلامت و حافظه



Neuro Biom


فرگشت

فرگشت داستانی است از نوآوری طبیعت؛ از لحظه‌ای که نخستین سلول‌ها تصمیم گرفتند متفاوت شوند تا زمانی که مغز انسان پیچیدگی را معنا کرد. در این بخش، رد پای تکامل را در ساختار مغز، مهارت‌های حرکتی و حافظه دنبال می‌کنیم؛ از نخست‌ها تا انسان امروزی. فرگشت نه فقط درباره گذشته، بلکه آینده‌ای است برای فهم اینکه چرا چنین شده‌ایم و چگونه می‌توانیم به سوی آینده‌ای آگاه‌تر گام برداریم.





محمد علی حیدری - ارشد نانوبیوتکنولوژی



در تکامل نخستی‌ها، ارتباط تنگاتنگی بین توسعه مهارت‌های دستی، استفاده از ابزار و رشد مغز مشاهده می‌شود. این ارتباط نشان‌دهنده یک فرآیند هم‌تکاملی است که در آن، بهبود توانایی‌های دستی و حرکتی نه تنها به بقا و سازگاری کمک کرده، بلکه به افزایش پیچیدگی مغز و قابلیت‌های شناختی منجر شده است. همچنین مطالعات اخیر بر روی نخستی‌ها، از جمله شامپانزه‌ها، گوریل‌ها و انسان‌ها انجام شده است، بر این نکته تأکید دارند که ویژگی‌هایی مانند انگشت شست مخالف نقش کلیدی در این فرآیند ایفا کرده‌اند. انگشت شست مخالف به توانایی حرکت شست به سمت سایر انگشتان دست گفته می‌شود، طوری که بتواند اشیاء را محکم بگیرد، فشار دهد یا بچرخاند.

۱. نقش انگشت شست در پیشرفت مهارت‌های دستی

انگشت شست مخالف یکی از ویژگی‌های کلیدی در تکامل نخستی‌ها است که امکان در دست گرفتن دقیق اجسام و دست‌ورزی در اشیاء را فراهم می‌کند. این ویژگی، که در اکثر نخستی‌ها وجود دارد، به ویژه در گونه‌های بالاتر مانند انسان‌ها و میمون‌های بزرگ توسعه یافته‌تر است. تحقیقات نشان می‌دهد که طول بیشتر انگشت شست با چیره دستی پیشرفته‌تر مرتبط است و این امر به نوبه خود بر تکامل مغز تأثیر گذاشته است. برای مثال، مطالعاتی بر روی فسیل‌های نخستی‌سانان نشان می‌دهد که افزایش مهارت‌های دستی در حدود ۲ میلیون سال پیش، با توسعه انگشت شست مخالف آغاز شده و به استفاده از ابزارهای اولیه منجر شده است. در نخستی‌های مدرن، گونه‌هایی مانند شامپانزه‌ها که انگشت شست بلندتری دارند، مهارت‌های دستی پیچیده‌تری مانند شکستن دانه‌ها و میوه‌ها با سنگ را نشان می‌دهند، که این مهارت‌ها با افزایش موفقیت در بقا مرتبط است.

برای مثال میمون‌های مارموس و لنگورهای آسیایی فاقد انگشت شست مخالف بلند هستند. این ویژگی باعث می‌شود قدرت گرفتن محکم روی شاخه‌های بزرگ و مستقیم کمتر شود و توانایی انجام کارهای ظریف مانند گرفتن میوه‌های کوچک یا ابزارسازی محدود شود. به طور کلی، انگشت شست مخالف نه تنها زبر دستی را افزایش داده، بلکه زمینه‌ای برای توسعه ابزارسازی را نیز فراهم کرده است.



۲. ارتباط استفاده از ابزار با رشد مغز در نخستی‌ها

استفاده از ابزار یکی از نشانه‌های کلیدی هوش در نخستی‌ها است که با افزایش اندازه و پیچیدگی مغز همبستگی دارد. مطالعات نشان می‌دهند که گونه‌های نخستی که استفاده از ابزار و جستجوی غذا با ابزار را از خود نشان می‌دهند، دارای پیچیدگی بالاتری هستند، که این امر با اندازه مغز بزرگ‌تر نیز مرتبط است. برای نمونه، در شامپانزه‌ها و میمون‌های CAPUCHIN، استفاده از ابزارهای سنگی برای دسترسی به غذا با انسفالیزاسیون (نسبت رشد و بزرگی مغز نسبت به اندازه بدن) بالاتر همراه است. تحقیقات اخیر بر روی بیش از ۱۰۰ گونه نخستی نشان می‌دهد که استفاده از ابزار رابطه قوی‌تری با اندازه مغز دارد، اما این رابطه در نواحی خاصی از مغز مانند قشر حرکتی برجسته نیست، بلکه بیشتر به ساختار کلی مغز مربوط می‌شود. همچنین، تکامل در استفاده از ابزار با عوامل اجتماعی و غذایی ترکیب شده و به رشد مغز کمک کرده است. در انسان‌ها این فرآیند به اوج رسیده، جایی که ابزارسازی پیچیده با افزایش حجم مغز همراه بوده و به توسعه فرهنگ منجر شده است.



۳. تأثیر مهارت‌های حرکتی بر توسعه شناخت

مهارت‌های حرکتی نقش مهمی در توسعه قابلیت‌های شناختی در نخستی‌ها ایفا می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که نخستی‌ها با مغز بزرگ‌تر قادر به اجرای حرکات دستی پیچیده‌تری هستند، که این امر به نوبه خود ادراک را تقویت می‌کند. برای مثال، در شامپانزه‌ها، بازی اجتماعی با نقاط عطف رشد حرکتی و اجتماعی همبستگی دارد، که این بازی‌ها به یادگیری کمک می‌کنند. مطالعات بر روی شامپانزه‌های ماده نشان‌دهنده کاهش همزمان ادراک و مهارت‌های حرکتی با افزایش سن است، که این امر ارتباط نزدیک بین این دو حوزه را تأیید می‌کند. همچنین، افزایش پیچیدگی سیستم حرکتی در نخستی‌ها به پیدایش توانایی‌های شناختی بالا مانند برنامه ریزی و حل مسئله منجر شده است. ارتباط بین پیچیدگی سیستم حرکتی و توانایی‌های شناختی در نخستی‌ها به چند مکانیزم اصلی برمی‌گردد:

■ **نیاز به کنترل دقیق دست و پا:** نخستی‌هایی که مجبورند روی شاخه‌ها حرکت کنند یا اشیاء کوچک را بگیرند، نیاز دارند حرکات دقیق و هماهنگ داشته باشند. این کنترل دقیق شامل برنامه‌ریزی حرکتی، پیش‌بینی موقعیت شاخه‌ها، و تنظیم نیرو و تعادل است.

■ **تحریک مغز و افزایش شبکه‌های عصبی:** پیچیدگی حرکات باعث فعال شدن بخش‌های مختلف مغز، به ویژه مناطق قشر حرکتی و پره‌فرونتال می‌شود. این مناطق نه تنها حرکت را کنترل می‌کنند، بلکه با تصمیم‌گیری، حل مسئله و برنامه‌ریزی مرتبط هستند.

■ **مهارت‌های شناختی ناشی از تعامل با محیط:** گرفتن غذا از شاخه‌های نازک، استفاده از ابزار یا باز کردن میوه‌های سخت، نیازمند حل مسئله و تفکر سلسله‌مراتبی است. هر چه سیستم حرکتی پیچیده‌تر باشد، مغز مجبور است پیش‌بینی و برنامه‌ریزی حرکتی بیشتری انجام دهد، که به طور همزمان توانایی‌های شناختی را تحریک و توسعه می‌دهد.

ادراک فیزیکی و اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌های شناختی نخستی‌ها و انسان‌ها محسوب می‌شود. **ادراک فیزیکی** به توانایی درک محیط اطراف، شامل فاصله‌ها، ارتفاع‌ها و موقعیت اشیاء و موانع اشاره دارد و به نخستی‌ها امکان می‌دهد مسیر حرکت خود را پیش‌بینی و حرکات خود را با دقت تنظیم کنند. در مقابل، **ادراک اجتماعی** توانایی درک رفتار، نیت و احساسات دیگران و شناخت روابط اجتماعی است که به همکاری، رقابت و یادگیری اجتماعی کمک می‌کند.

در انسان‌ها، ترکیب این ادراک‌ها با برتری ثبات حرکتی، به ویژه در راه رفتن دوپا و کنترل دست‌ها، باعث شده تا دست‌ها برای استفاده از ابزار، انجام فعالیت‌های پیچیده و برنامه ریزی حرکتی دقیق آزاد باشند. این برتری حرکتی، همراه با ادراک فیزیکی و اجتماعی، زمینه را برای افزایش توانایی‌های شناختی و تطبیق بهتر انسان با محیط فراهم می‌کند. در مقایسه با انسان‌ها، شامپانزه‌ها مراحل تکوین مشابهی در ادراک فیزیکی و اجتماعی نشان می‌دهند، اما انسان‌ها در ثبات حرکتی برتری دارند.



REFERENCES

- Biomechanics of the human thumb and the evolution of dexterity - **ScienceDirect** (2021)
- Human evolution: Thumbs up for efficiency - **ScienceDirect** (2021)
- Manipulation complexity in primates coevolved with brain size and terrestriality - **Nature** (2016)
- Human dexterity and brains evolved hand in hand - **Nature** (2025)
- Motor system evolution and the emergence of high cognitive functions - **ScienceDirect** (2014)
- Neural changes in the primate brain correlated with the evolution of complex motor skills - **Nature** (2016)





محمدحسن احمدی، کارشناس زیست‌شناسی جانوری



مغز، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین و پیچیده‌ترین اندام‌های زیستی، نقش کلیدی در بقای موجودات و فعالیت‌های شناختی آن‌ها ایفا می‌کند. تفاوت‌های گسترده در ساختار، اندازه و سازمان‌دهی مغز میان گونه‌های مختلف این سوال را به وجود می‌آورد که "چرا با وجود هدف مشترک حفظ بقا، مغزها تا این حد تنوع دارند؟" در طول فرایند تکامل، مغز موجودات با شرایط محیطی گوناگون سازگار شده است؛ هر گونه با فشارهای محیطی خاصی روبه‌رو بوده که موجب شکل‌گیری ساختارها و عملکردهای مغزی متناسب با آن‌ها شده است.


در این بخش از نشریه علمی-دانشجویی بیوم، ابتدا به بررسی تنوع مغزی و مفاهیم سازگاری می‌پردازیم، سپس نمونه‌هایی از مغزهای مختلف و توانایی‌های اختصاصی آن‌ها را مرور می‌کنیم و در نهایت اهمیت تنوع زیستی در تکامل مغزها و پیامدهای آن برای بقای گونه‌ها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

۱. تنوع مغزی و سازگاری با محیط‌های مختلف

■ مبانی تکامل مغز و سازگاری عصبی در گونه‌ها

مطالعه «نورواناتومی مقایسه‌ای» به ما امکان می‌دهد تا ساختار مغز گونه‌های مختلف را مقایسه کنیم و الگوهای مشترک و تفاوت‌های آن‌ها را بشناسیم. در این زمینه، مغز گونه‌ها به صورت ساختارهایی انتخاب شده در طول تکامل دیده می‌شوند که تحت عواملی از جمله فشارهای محیطی، منابع انرژی، منابع تغذیه‌ای و محدودیت‌های فیزیولوژیک شکل گرفته‌اند.

نکته مهم دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، "همبستگی بین اندازه مغز و اندازه بدن" است؛ بدین معنا که بخشی از تفاوت اندازه مغزها به تفاوت حجم بدن وابسته است، اما عوامل دیگری مانند پیچیدگی محیط و رفتار اجتماعی نیز در اندازه مغز تأثیر دارند.



میشو و همکاران (2022) در پژوهشی بر روی 174 گونه از گوشتخواران نشان می‌دهند که بین اندازه مغز و پارامترهای اکولوژیکی مانند گستره جغرافیایی و دما، رابطه‌ای پیچیده وجود دارد و هزینه‌های متابولیک افزایش مغز، محدودیتی برای گزینش به سمت بزرگ‌تر شدن ایجاد می‌کند.

■ تأثیر محیط بر سازگاری مغزی

هاس و همکاران (2024) در مطالعه‌ای بر روی بزرگسالان سالمند نشان دادند که محدودیت‌های محیطی قادرند هم در مقیاس کوچک (ارتباطات میان نورون‌ها در نواحی خاصی از مغز) و هم در مقیاس سراسری (در شبکه‌های گسترده و سازماندهی کلی ساختار مغزی) تغییراتی ایجاد کنند، که نشان‌دهنده پلاستیسیته عصبی تطبیقی مغز نسبت به شرایط محیطی است. (توانایی مغز برای تطبیق با محیط). به علاوه، با تغییرات زیست محیطی سریع (برای مثال تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی)، مغز موجودات ممکن است در برخی سیستم‌ها نتوانند خود را تطبیق دهند یا ممکن است مسیرهای تطبیقی جدیدی شکل بگیرد. در نتیجه، تنوع مغزی نه تنها نتیجه تاریخ تکاملی، بلکه پاسخ زنده به شرایط فعلی محیطی نیز هست.



۲. نمونه‌هایی از عملکردهای اختصاصی مغزهای متفاوت


ورودی‌های نورون‌های ترشح‌کننده نوروترنسمیترهایی مانند **سروتونین** و **اکتوپامین** به بخش‌های اولیه سامانه بویایی (مانند **پياز بویایی** در پستانداران یا **لوب بویایی** در حشرات) ارسال می‌شوند و نقش کلیدی در **تنظیم و کدگذاری اطلاعات بویایی** ایفا می‌کنند. پردازش بویایی در زنبور سریع و دقیق است، در حالی که در موش و انسان، این پردازش به صورت سلسله‌مراتبی و در قشر بویایی اولیه انجام می‌شود و می‌تواند تحت تأثیر تجربه و سن تغییر کند. تفاوت‌های ساختاری و عملکردی بین گونه‌ها نشان‌دهنده تکامل تطبیقی سیستم بویایی بر اساس نیازهای رفتاری و زیستی هر گونه است.

در بررسی ساختار مغز انسان و دیگر پستانداران، مغز انسان از نظر رشد در بخش‌هایی مانند قشر و مسیرهای ارتباطی پیچیده‌تر است **BAIZER** و همکاران (2023) در مطالعه‌ای نشان دادند که برخی هسته‌های ساقه مغز در انسان دارای توسعه خاص و تفاوت ساختاری نسبت به گونه‌های دیگر هستند. همچنین، بخش‌هایی مانند قشر پیش‌پیشانی در انسان از نظر ارتباطات و تراکم عصبی تفاوت‌های ساختاری قابل توجهی نسبت به میمون‌ها دارند.

مطالعات نشان داده‌اند سیستم بویایی در زنبور عسل، موش و انسان، اگرچه از نظر اصول پردازش سیگنال‌ها مشابه است اما از نظر ساختاری و عملکردی تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در زنبور عسل، **لوب شاخکی** به عنوان اولین ایستگاه پردازش عمل می‌کند و مشابه بطن بویایی پستانداران، شامل گلوبول‌های بویایی است که ورودی‌های عصبی را دریافت می‌کنند.



این موضوع نشان می‌دهد که چشم‌های ابتدایی این جانور حساس به نور هستند و شاید تابش حرارتی منتشرشده از منافذ دریایی و انواع مختلف تابش‌های نورانی را تشخیص دهند. علاوه بر این، برخلاف انتظار، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه نواحی مرتبط با تشخیص مواد شیمیایی از نظر ساختاری غیرمعمول یا به‌طور قابل توجهی بزرگ تر باشند تا کاهش توانایی بینایی را جبران کنند، مشاهده نشده است. بنابراین، مراکز بینایی و بویایی *R.exoculata* فاقد ویژگی‌های برجسته هستند و به احتمال زیاد نقش غالبی در رفتار این جانوران ایفا نمی‌کنند.




۲. نمونه‌هایی از عملکردهای اختصاصی مغزهای متفاوت

تنوع زیستی، هم در سطح ژنتیکی و هم در سطح عصبی، نقش محوری در تکامل و بقای گونه‌ها ایفا می‌کند، زیرا در حضور طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها امکان سازگاری بهتر با شرایط محیطی متغیر را ایجاد می‌کند. مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهند که گونه‌هایی با مغزهای متفاوت و عملکردهای اختصاصی، مانند اختاپوس‌ها با شبکه‌های عصبی توزیع‌شده (توزیع تعداد زیادی نورون عصبی در بازوها و سایر بخش‌های بدن) و توانایی حل مسئله پیچیده، کلاغ‌ها با حافظه فضایی قوی و توانایی استفاده از ابزار (توانایی استفاده از اشیاء خارجی، مثل شاخه یا سیم به عنوان ابزار برای دسترسی به غذا یا حل مسائل محیطی) و دلفین‌ها با پردازش پیچیده اجتماعی و شناختی، از راهبردهای متفاوتی برای بقا بهره می‌برند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده پلاستیسیته عصبی تطبیقی و انعطاف‌پذیری رفتاری است که شانس بقا و موفقیت تکاملی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، تنوع زیستی نه تنها تنوع ژنتیکی گونه‌ها را تضمین می‌کند، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در مواجهه با فشارهای زیست‌محیطی و چالش‌های تکاملی، راهبردهای شناختی و عصبی متفاوتی را پیاده کنند.



REFERENCES

- Comparative Neuroanatomy - بررسی مفاهیم پایه و روش ها - PMC+2PMC+2
- The impact of environmental factors on the evolution of brain size in carnivorans Nature
- Rearing environment defines local and global plasticity PMC
- Neurobiology and Changing Ecosystems: toward understanding ... arXiv
- Comparative study of chemical neuroanatomy of the olfactory system PMC
- Comparative analysis of four nuclei in the human brainstem Frontiers+1
- Prefrontal cortex: from monkey to man (تفاوت ساختاری بین انسان و میمون) OUP Academic
- Brain evolution: scaling, adaptation و allometry royalsocietypublishing.org+1
- Brain Evolution: Adaptations to extreme conditions (بی‌مهرگان محیط ویژه) eLife





عرفان عجم زاده / کارشناسی زیست شناسی جانوری




در روان شناسی تکاملی و علوم رفتاری، حافظه ژنتیکی پدیده‌ای نظری است که در آن انواع خاصی از خاطرات می‌توانند از والدین به فرزند برسند، به گونه‌ای که در بدو تولد و در غیاب هر گونه تجربه حسی مرتبط، این خاطرات وجود داشته باشند. این نوع خاطرات می‌توانند در طول روزگاران مدید در ژنوم گنجانده شوند و درواقع، هر فردی بخشی از تجربه نیاکان دوردستش را به ارث ببرد. این آگاهی از طریق انتخاب طبیعی به ما می‌رسد و در مدارهای عصبی و سازوکارهای فیزیولوژیکی دستگاه عصبی نقش می‌بندد و مجموعه‌ای ضروری از اطلاعاتی را نشان می‌دهد که رفتار ما را هدایت می‌کنند و بر آن تاثیر می‌گذارند.

۱. حافظه و ذخیره اطلاعات حیاتی در فرآیند بقا

شرطی سازی ترس نوع خاصی از شرطی سازی کلاسیک است که پاسخ ترس (مثلاً افزایش ضربان قلب یا واکنش‌های اجتنابی) به محرک خنثی ایجاد می‌شود که با محرک آسیب‌زا یا تهدیدآمیز جفت شده است. شرطی سازی ترس پاولوفی نمونه‌ای کلاسیک از یادگیری ارتباطی است که به موجودات اجازه می‌دهد بین محرک‌های خنثی (مانند صدا) و رویدادهای تهدیدکننده (مانند شوک) ارتباط برقرار کنند. این فرایند منجر به شکل‌گیری حافظه‌های پایدار می‌شود که پاسخ‌های سریع و سازگار به خطرات آینده را ممکن می‌سازند.


■ شرطی سازی ترس اولین قدم در مکانیزم بقا

یادگیری فرآیندی است که از طریق آن افراد دانش، رفتارها، نگرش‌ها و ایده‌های جدیدی را کسب می‌کنند. انسان‌ها برای زنده ماندن باید نسبت به روابط معنادار و تصادفی بین رویدادهای محیط حساس باشند. فرآیند یادگیری از طریق مسیرهای ناخودآگاه و خودآگاه اتفاق می‌افتد. "شرطی سازی کلاسیک / پاولوفی"، که به عنوان یادگیری تداعی گر نیز شناخته می‌شود، فرآیندی ناخودآگاه است که در آن یک پاسخ خودکار و شرطی شده بایک محرک خاص مرتبط می‌شود.




■ مکانیسم‌های عصبی و مولکولی حافظه ترس

مدارهای عصبی در ناحیه‌ای از مغز به نام آمیگدال نقش کلیدی در رمزگذاری و ذخیره حافظه‌های ترس ایفا می‌کنند. بین پدیده‌ی تقویت طولانی مدت (LTP) و حافظه در شرطی‌سازی ترس که نوعی یادگیری وابسته به آمیگدال است و در آن یک محرک شرطی بی‌ضرر پس از جفت شدن با یک محرک غیرشرطی آزاددهنده پاسخ‌های ترس را ایجاد می‌کند رابطه وجود دارد. پدیده‌ی تقویت طولانی‌مدت به عنوان مکانیسم پایه‌ای پلاستیسیته (انعطاف‌پذیری) سیناپسی شناخته می‌شود که در طول شرطی‌سازی ترس رخ می‌دهد و باعث تقویت ارتباطات عصبی می‌شود. تغییرات پایدار در فعالیت عصبی و بیان برخی ژن‌ها مانند گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئید (GR) مبنای حافظه بلندمدت ترس هستند.




■ نقش هیپوکامپ و یکپارچه‌سازی حافظه

هیپوکامپ در ابتدای شکل‌گیری حافظه‌های جدید (به‌ویژه حافظه‌های وابسته به زمینه) نقش دارد، به این معنا که بازیابی اطلاعات زمانی آسان‌تر است که شرایط یا محیطی که در آن مطلب آموخته شده، با شرایط زمان یادآوری یکسان باشد. مثلاً اگر در اتاقی خاص مطالعه کنید، احتمال یادآوری همان مطالب در همان اتاق بیشتر از زمانی است که در محیطی متفاوت قرار دارید. فرآیند «یکپارچه‌سازی سیستم‌ها» با هدف هماهنگی و متصل کردن بخش‌ها یا سامانه‌های جدا از هم به گونه‌ای که به صورت یک کل منسجم و کارآمد عمل کنند، به تدریج حافظه را از وابستگی به هیپوکامپ خارج کرده و آن را در قشر مغز تثبیت می‌کند تا دسترسی پایدار و مستقل به اطلاعات حیاتی ممکن شود.





■ تأثیر عوامل محیطی و اپی‌ژنتیک بر حافظه و پاسخ به استرس

رفتارهای مادرانه (مانند لیسیدن و تیمار کردن) می‌توانند تغییرات اپی‌ژنتیکی در ژن‌های مرتبط با پاسخ به استرس مانند GR در فرزند ایجاد کنند. این تغییرات می‌توانند پاسخ‌های هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) به استرس را تعدیل کرده و بقا را در محیط‌های پرچالش بهبود بخشند.



۲. نقش انتخاب طبیعی در شکل گیری حافظه

مغز انسان، به عنوان پیچیده ترین عضو بدن، طی فرآیند تکامل میلیون ساله، تحت تأثیر انتخاب طبیعی شکل گرفته است. یکی از کلیدی ترین قابلیت های مغز که نقش حیاتی در بقا دارد، حافظه است. انتخاب طبیعی با ترجیح دادن افرادی که توانایی بهتری در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات داشتند، به تدریج مکانیسم های حافظه را بهبود بخشیده است.




■ پایه عصب شناختی حافظه

تکامل مغز منجر به ایجاد شبکه های پیچیده ای از نورون ها شده که ذخیره سازی و بازیابی خاطرات را ممکن می سازند. این شبکه ها تحت تأثیر عوامل داخلی (ژنتیک) و خارجی (محیط) قرار دارند.


۳. ارتباط خاطرات شخصی با یادگیری و بقا

خاطرات تنها بازتابی از گذشته نیستند، بلکه نقش اساسی در شکل دهی به هویت، رفتار و حتی توانایی های یادگیری ما دارند. مطالعاتی مانند پژوهش سال ۲۰۱۳ دانشگاه اموری نشان داده اند که تجربیات و یادگیری های والدین - حتی پیش از بارداری - می توانند از طریق مکانیسم های ژنتیکی به نسل های بعد منتقل شوند. این انتقال نه تنها در رفتار، بلکه در ساختار مغز نسل های بعد نیز تأثیر می گذارد و می تواند با اختلالاتی مانند فوبیا، اضطراب و سایر مشکلات عصبی-روانی مرتبط باشد.




■ حافظه به عنوان ابزار بقا

مغز برای پاسخ به نیازهای بقا (مانند یافتن غذا، اجتناب از خطرات و حفظ امنیت) تکامل یافته است، همچنین حافظه به انسان اجازه می دهد تجربیات گذشته را ذخیره کند و از آنها برای تصمیم گیری های آینده استفاده نماید.



■ تأثیر محیط و تجربیات

تجربیات اولیه (به ویژه در کودکی) مسیرهای عصبی را شکل می دهند و تعیین می کنند کدام اتصالات مغزی تقویت یا تضعیف شوند. توجه، همدلی و تعامل اجتماعی از عوامل کلیدی در تقویت حافظه و یادگیری هستند.




■ سازگاری با تغییرات

اگرچه مغز برای "حفظ وضعیت موجود" تکامل یافته، اما توانایی سازگاری با محیط های جدید (مانند دنیای دیجیتال) را نیز دارد. فشارهای تکاملی مدرن (مانند استرس و حجم اطلاعات) ممکن است به شکل گیری انواع جدیدی از حافظه و پردازش اطلاعات منجر شوند.




از سوی دیگر، حافظه و یادگیری فرایندهایی هستند که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند هیجانات، خواب، تمرکز و نشانه های محیطی قرار می گیرند. مغز ما با استفاده از نواحی مختلف مانند هیپوکامپ و آمیگدال، اطلاعات را رمزگذاری، تثبیت و بازیابی می کند. جالب اینجاست که حافظه به طور طبیعی برای حفظ اطلاعات مرتبط با بقا و پاداش بهینه شده است؛ پدیده های که به «اثر پردازش بقا» معروف است. «پردازش بقا» به پدیده ای اشاره دارد که در آن اطلاعاتی که از منظر بقا پردازش می شوند، بهتر در حافظه ذخیره و بازیابی می شوند. در پژوهش نیرن و همکاران (2007)، از شرکت کنندگان خواسته شد واژه ها را یا از نظر خوشایندی، یا از منظر بقا در طبیعت ارزیابی کنند. نتایج نشان داد واژه هایی که در چارچوب بقا پردازش شده بودند، بسیار بهتر در حافظه باقی ماندند؛ نشانگر آنکه ذهن انسان اطلاعات مرتبط با بقا را عمیق تر رمزگذاری می کند.



این اثر نشان می دهد که وقتی اطلاعات در چارچوب بقا پردازش می شوند - مثلاً زمانی که فرد واژه ها یا موقعیتها را در رابطه با زنده ماندن ارزیابی می کند - حافظه به طور چشمگیری بهبود می یابد. حتی مشوقهای بیرونی مانند پاداش نیز می توانند به صورت مستقل به تقویت حافظه کمک کنند. این یافته ها حاکی از آن است که سیستم حافظه انسان طی فرگشت به گونه ای شکل گرفته که اطلاعات حیاتی برای بقا را اولویت بندی کند.

در نتیجه، خاطرات شخصی نه تنها گذشته ما را می سازند، بلکه از طریق یادگیری و سازوکارهای عصبی-رژنتیکی، بر بقا و سازگاری نسلهای آینده نیز تأثیر می گذارند. تقویت حافظه از طریق روشهایی مانند تکرار فاصله دار، تصویرسازی ذهنی و زندگی سالم، نه تنها یک ابزار برای موفقیت فردی، بلکه راهی برای حفظ پیوند با گذشته و تضمین تداوم زیستی است.

REFERENCES




جهان جانوری؛ از رن تا رفتار

در جهان جانوری، نگاهی از درون به ذهن و مغز موجودات دیگر می‌اندازیم؛ از سلول‌های گمنام گل‌ها تا شبکه‌های عصبی که خواب، رویا و بقا را می‌سازند. هر موجود زنده شیوه‌ای ویژه برای اندیشیدن و احساس دارد. در این بخش، از رمزهای درونی حیات جانوران پرده برمی‌داریم و نشان می‌دهیم که درک مغز دیگر گونه‌ها، درک تازه‌ای از انسان به ما می‌بخشد.





شیرین طائب- کارشناسی میکروبیولوژی




مغز انسان اندام پیچیده و منحصر به فردی متشکل از میلیاردها نورون می باشد . نورون ها در شبکه ای پیچیده با هم در ارتباطند تا پایه های تفکر، احساس، حرکت، تحلیل و حافظه را شکل دهند. هر نورون مانند یک واحد پردازش اطلاعات عمل می کند که پیام ها را دریافت، تحلیل و منتقل می سازد. اتصال و ارتباط بین نورون ها، در ساختاری به نام سیناپس رخ می دهد؛ فضایی میکروسکوپی که محل تبادل اطلاعات عصبی است. این تبادل به دوروش اصلی الکتریکی و شیمیایی صورت می گیرد. لازم به ذکر است که هماهنگی بین این دو نوع انتقال برای عملکرد صحیح مغز حیاتی بوده و اختلال در این ارتباطات می تواند منجر به بیماری های عصبی مانند آلزایمر، افسردگی یا صرع شود. از طرفی دیگر، درک این دنیای پیچیده برای توسعه درمان های نوین و فناوری های زیستی اهمیت فراوانی دارد.

سیناپس: گذرگاه ارتباطی اعصاب

سیناپس ها ارتباط عملکردی بین یک نورون با نورون دیگر و یا با یک سلول غیرعصبی (مانند سلول عضلانی یا غده ای) را ممکن می سازند. این ساختارها اساس تمام فرآیندهای عصبی، از تفکر و حافظه گرفته تا حرکت و ادراک هستند. سیناپس ها، جهت پخش شدن سیگنال ها در شبکه های عصبی را تعیین میکنند و می توانند انواعی از سیگنال های مهار و تحریکی را دریافت کنند. در اصل آن ها عملکردی انتخابی دارند؛ به این معنا که غالباً سیگنال های ضعیف را بلوکه کرده و به سیگنال های قوی اجازه عبور می دهند، اما در مواردی هم سیگنال های ضعیف را انتخاب نموده و آن ها را تقویت میکنند. **سیناپس ها عموماً در دو دسته طبقه بندی می شوند:**

سیناپس های الکتریکی

در مقابل، سیناپس های الکتریکی از طریق ساختارهایی به نام GAP JUNCTION عمل می کنند. این کانال های پروتئینی که از CONNEXIN ها ساخته شده اند، تشکیلاتی لوله ای شکل را ایجاد کرده که امکان انتقال یون ها را از سلولی به سلول دیگر فراهم میکنند و در نتیجه میتوانند جریان الکتریکی ای در درمیان سلول ها ایجاد نمایند.




سیناپس های شیمیایی

سیناپس های شیمیایی رایج ترین نوع اتصال بین نورون ها هستند. در این نوع انتقال، پایانه پیش سیناپسی با آزادسازی میانجی های عصبی به فضای سیناپسی، سیگنال را به نورون بعدی منتقل می کند. این نوروترنسمیترها به گیرنده های پروتئینی اختصاصی در نورون پس سیناپسی متصل شده و باعث تغییر در پتانسیل غشای آن می شوند. 40 نوع ترنسمیتر شناخته شده اند که از معروف ترین آن ها میتوان به (گلوتامات، نوراپی نفرین، استیل کولین، GABA و دوپامین) اشاره نمود.



Neuro Biom

تغییر ولتاژ، یون های کلسیم و فرآیند فسفوریلاسیون، توانایی تعدیل GAP JUNCTION ها را دارند. این تعدیل، باز یا بسته شدن کانال ها را امکان پذیر می سازد و انتشار و جریان های الکتریکی بین دو سلول را بهبود می بخشد.



هم صدایی نورون ها

هر یک از نورون ها مانند نوازنده ای در یک گروه بزرگ موسیقی هستند؛ اگر هر کدام بدون توجه به بقیه ساز خود را بنوازد، تنها سر و صدایی بی معنی ایجاد می شود. اما اگر همه با هم و در زمان مناسب بنوازند، یک آوای هماهنگ و زیبا شکل می گیرد. این پدیده همان هماهنگی عصبی است. انتقال همزمان پیام عصبی میان نورون ها نه تنها رایج است، بلکه از نظر عملکردی بسیار اهمیت دارد. اگر هر نورون به طور مستقل فعال شود، مغز قادر نخواهد بود الگوهای پیچیده اطلاعات را رمزگذاری کند. نکته قابل توجه این است که هماهنگی میان نورون ها تنها در سطح سلولی نیست، بلکه این هماهنگی بین بخش های مختلف مغز نیز مشاهده می شود.

یکی از سازوکارهای بنیادین در شکل گیری هماهنگی میان نورون ها، پدیده ای به نام "STDP" است. در این فرآیند، اگر دو نورون در فاصله کمی از یکدیگر فعال شوند، پیوند سیناپسی میان آن ها تقویت می شود؛ مغز این هم زمانی را به عنوان نشانه ای از ارتباط معنادار می پذیرد و آن را در ساختار خود ثبت می کند. این تقویت تدریجی باعث می شود الگوهای انتقال پیام عصبی به سوی هم نوایی سوق پیدا کنند و در نهایت مدارهایی تخصصی برای پردازش پیام های شناختی، حسی یا حرکتی شکل بگیرند.

در مقابل، عدم هماهنگی کافی میان نورون ها پیامدهایی به دنبال دارد. بیماری هایی مانند اسکیزوفرنی، صرع، اوتیسم، آلزایمر و پارکینسون با هماهنگی عصبی غیرطبیعی و خارج از الگوی نرمال آن مرتبط هستند. بنابراین، بررسی الگوهای هماهنگی می تواند به عنوان نشانگر عملکردی مغز در تشخیص و درمان بیماری ها مورد استفاده قرارگیرد.


REFERENCES





سمیرا مظفری - دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

برای بیش از یک قرن، سلول های گلیال که نامشان از واژه یونانی GLIAL به معنای چسب گرفته شده، در حاشیه تحقیقات عصب شناسی قرار داشتند. دانشمندانی مانند ردولف ویرخو آن ها را بافتی غیرفعال و صرفاً حمایتی می دانستند که نورون ها را در جای خود نگه می دارد (1). حتی در آثار برجسته ی سانتیاگو رامون ای کاخال، نورون ها تنها واحد پردازش اطلاعات معرفی شدند و نقش گلیال ها نادیده گرفته شد. اما تحولات سریع در علم عصب شناسی طی دهه های اخیر، این دیدگاه ساده انگارانه را کاملاً متحول کرده است (2). اکنون با استفاده از تکنیک های نوین تصویربرداری، الکتروفیزیولوژی و ژنتیک، می دانیم که سلول های گلیال نه تنها پشتیبانان منفعل نیستند، بلکه بازیگرانی کلیدی و پویا در تمامی فرآیندهای حیاتی مغز به شمار می روند. آن ها در فرآیندهای رشد و تکامل مغزی، شکل گیری و پاک سازی سیناپس ها، تنظیم جریان خون، و پاسخ های ایمنی نقشی فعال دارند. در برخی مناطق مغزی مانند قشر مغز، نسبت سلول های گلیال به نورون ها به ۱:۱ می رسد، که این خود نشان دهنده اهمیت فراوان آن ها است.



۱. انواع سلول های گلیال و معماری عملکردی آن ها

سلول های گلیال به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

■ گلیال های سیستم عصبی مرکزی (CNS، شامل مغز و نخاع)

■ گلیال های سیستم عصبی محیطی (PNS).

■ آستروسیت ها :

آستروسیت ها، که فراوان ترین گلیال های ستاره ای در مغز و هاب های کنترلی سیستم عصبی هستند، چندین وظیفه حیاتی را انجام می دهند. آن ها با جذب یون های پتاسیم اضافی، محیط یونی اطراف نورون ها را پایدار نگه می دارند. همچنین، با جذب سریع گلوتامات از شکاف سیناپسی، از تجمع آن و در نتیجه از تحریک بیش از حد نورون ها جلوگیری می کنند. آستروسیت ها جزئی از سیناپس سه بخشی هستند و با آزاد سازی گلیوترانسمیترها مانند دی-سیرین و ATP، به طور مستقیم بر انتقال پیام های عصبی، یادگیری و حافظه تأثیر می گذارند. علاوه بر این، با ارسال سیگنال هایی برای گشادی یا انقباض عروق خونی، جریان خون و اکسیژن رسانی به مناطق فعال مغز را تنظیم می کنند. در نهایت، آن ها با تبدیل گلوکز به لاکتات، منبع انرژی سریع و ضروری را برای تغذیه نورون ها فراهم می سازند.



سلول های گلیال به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

■ گلیال های سیستم عصبی مرکزی (CNS، شامل مغز و نخاع)

■ گلیال های سیستم عصبی محیطی (PNS).

■ اولیگودندروسیت ها: تولیدکنندگان میلین

وظیفه اصلی این سلول ها، تولید غلاف میلین در CNS است. غلاف میلین یک ماده لیپیدی و پروتئینی است که مانند عایق، دور آکسون ها پیچیده می شود و باعث می شود پیام های عصبی به صورت جهشی و با سرعت بسیار بالا از یک گره رانویه به گره دیگر منتقل شوند. هر اولیگودندروسیت می تواند چندین آکسون را به طور همزمان میلینه کند.

■ سلول های میکروگلیال

میکروگلیا سلول های ایمنی اختصاصی مغز هستند و نقش حیاتی شان بسیار فراتر از دفاع ساده است. آنها به طور مداوم در حالت استراحت، محیط اطراف نورون ها را برای یافتن آسیب یا پاتوژن پایش می کنند. در صورت شناسایی تهدید، وارد حالت فعال شده و مانند یک ماکروفاژ عمل می نمایند؛ در این حالت، از طریق فاگوسیتوز، بقایای سلولی، پاتوژن ها و پروتئین های سمی را بلعیده و پاک سازی می کنند. همچنین، میکروگلیا در دوران تکامل مغز با خوردن سیناپس های اضافی، به هرس کردن و اصلاح مدارهای عصبی کمک کرده و در شکل گیری صحیح مغز نقشی کلیدی دارند.

■ سلول های اپنڈیمال

این سلول ها سطح داخلی بطن های مغز و کانال مرکزی نخاع را می پوشانند. در بخش خاصی به نام شبکه کوروئید، این سلول ها مایع مغزی-نخاعی را تولید می کنند. مژک های روی سطح آنها به گردش این مایع که وظیفه حفاظت مکانیکی و انتقال مواد مغذی را دارد، کمک می کنند.

■ سلول های شوان

این سلول ها معادل اولیگودندروسیت ها در سیستم عصبی محیطی هستند و مسئول تولید غلاف میلین در اعصاب محیطی اند. تفاوت آنها این است که هر سلول شوان تنها یک بخش از یک آکسون را میلینه می کند. سلول های شوان همچنین در فرآیند ترمیم و بازسازی اعصاب آسیب دیده نقش حیاتی دارند.



امروزه اختلال در عملکرد سلول‌های گلیال، عامل اصلی یا یکی از عوامل تشدیدکننده بسیاری از بیماری‌های عصبی است، که این یافته‌ها افق‌های جدیدی درمانی را گشوده‌اند.

■ بیماری‌های دمی‌لینه‌کننده

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به غلاف میلین تولید شده توسط اولیگودندروسیت‌ها در CNS حمله می‌کند و آن را تخریب می‌نماید. این تخریب، باعث اختلال در انتقال پیام‌های عصبی، کند شدن یا توقف آن‌ها، و بروز علائم گسترده‌ای مانند ضعف عضلانی، بی‌حسی، و مشکلات بینایی می‌شود.

■ تومورهای مغزی (گلیوما)

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به غلاف میلین تولید شده توسط اولیگودندروسیت‌ها در CNS حمله می‌کند و آن را تخریب می‌نماید. این تخریب، باعث اختلال در انتقال پیام‌های عصبی، کند شدن یا توقف آن‌ها، و بروز علائم گسترده‌ای مانند ضعف عضلانی، بی‌حسی، و مشکلات بینایی می‌شود.

■ بیماری‌های نورودژنراتیو (آلزایمر، پارکینسون)

در بیماری‌هایی مانند آلزایمر و پارکینسون، التهاب مزمن عصبی که توسط میکروگلیا و آستروسیت‌های بیش از حد فعال ایجاد می‌شود، نقش مهمی در مرگ نورون‌ها ایفا می‌کند. در آلزایمر، میکروگلیا به جای پاک‌سازی صحیح پلاک‌های سمی آمیلوئید بتا، یک پاسخ التهابی مخرب را آغاز می‌کنند. آستروسیت‌ها نیز با تشکیل گلیوز واکنشی، مانع از بازسازی بافت عصبی می‌شوند.

■ سایر اختلالات

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اختلال در عملکرد سلول‌های گلیال ممکن است در بیماری‌هایی مانند افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، و حتی دردهای مزمن عصبی نیز نقش داشته باشد. این کشفیات تأیید می‌کنند که گلیال‌ها صرفاً چسب مغز نیستند، بلکه یک هدف درمانی کلیدی برای مبارزه با پیچیده‌ترین بیماری‌های مغزی محسوب می‌شوند.

REFERENCES





۱. تولد و تمایز نورون‌ها

در طول تکوین جنینی، سلول‌های بنیادی نوروینی و سلول‌های پیش‌ساز عصبی در ناحیه بطنی و بعداً در زون نیمه‌قشر به سرعت تقسیم می‌شوند و نسل‌های جدید نورون و گلیا تولید می‌کنند. دوره اوج نورون‌زایی در انسان عمدتاً در نیمه اول تا اواسط بارداری است، اما برخی نواحی قشری ممکن است تولید نورون را برای مدت طولانی‌تری ادامه دهند و نسبت نورون/گلیا در طول زمان تغییر می‌کند. مسیرهای سیگنال‌دهی مولکولی مثل **WNT**، **NOTCH** و **BMP** نقش کلیدی در تعیین سرنوشت سلولی (نورون در برابر گلیا) دارند و بیان ژن‌های منطقه‌ای در تعیین زیرگونه نورون‌ها مؤثر است. تغییرات زمانی یا مقداری در نورون‌زایی می‌تواند با اختلالات رشدی و تاخیرهای شناختی در مراحل بعدی زندگی مرتبط باشد؛ بنابراین شناخت دقیق زمان‌بندی و کنترل مولکولی این مرحله برای تشخیص و مداخله بالینی حیاتی است.




5 mm

۲. مهاجرت نورون‌ها و آرایش لایه‌ای قشر


پس از تولد نورون‌ها، آن‌ها باید به موقعیت نهایی خود در قشر مخ مهاجرت کنند تا لایه‌های قشری شش‌گانه شکل گیرد. نورون‌های پیرامیدال عمدتاً از طریق مهاجرت شعاعی به سوی سطح قشر حرکت می‌کنند، در حالی که نورون‌های اینترنورون از زیربناهای ژنتیکی مانند "GANGLIONIC EMINENCE" وارد قشر می‌شوند و معمولاً مهاجرت مماسی دارند. وجود جمعیت ویژه‌ای از گلیاهای شعاعی به عنوان داربست مهاجرتی و همچنین به عنوان سلول‌های پیش‌ساز، برای هدایت نورون‌ها ضروری است. ناهنجاری در مولکول‌های هدایت‌کننده یا ساختارهای سلولی می‌تواند موجب اختلالات مهاجرتی و بیماری‌هایی مانند لیسنسفال یا هتروتوپیا شود.



A)




B)



۳. آکسونوژنز، دندریت‌زایی و سیناپتوژنز

پس از استقرار در لایه‌های قشری، نورون‌ها شروع به رشد دندریت‌ها و آکسون‌ها می‌کنند و سیناپس‌های اولیه را برقرار می‌نمایند. فرایند سیناپتوژنز به صورت منطقه‌ای و زمانی متفاوت در قشر پیش می‌رود؛ برخی نواحی حسی زودتر و برخی نواحی پیش‌فرونتال با تأخیر بیشتری سیناپتوژنز را تجربه می‌کنند. پروتئین‌های نشانگری همچون SYNAPTOPHYSIN و PSD-95 برای بررسی تشکیل سیناپس‌ها به کار می‌روند و برخی مطالعات هیستوپاتولوژیک و تصویربرداری نشان داده‌اند که تراکم سیناپسی در دوران پری‌ناتال و اوایل پس از تولد به سرعت افزایش می‌یابد. شکل‌گیری شبکه‌های ابتدایی عصبی در این دوره پایه توانایی‌های عصبی-حسی و سپس شناختی را فراهم می‌آورد و هر گونه اختلال زمینه‌ای (مثلاً در بیان ژن یا تأثیرات محیطی) می‌تواند الگوی اتصال را تغییر دهد.



۴. اصلاح سیناپسی و بلوغ شبکه‌ها

پس از استقرار در لایه‌های قشری، نورون‌ها شروع به رشد دندریت‌ها و آکسون‌ها می‌کنند و سیناپس‌های اولیه را برقرار می‌نمایند. فرایند سیناپتوژنز به صورت منطقه‌ای و زمانی متفاوت در قشر پیش می‌رود؛ برخی نواحی حسی زودتر و برخی نواحی پیش‌فرونتال با تأخیر بیشتری سیناپتوژنز را تجربه می‌کنند. پروتئین‌های نشانگری همچون SYNAPTOPHYSIN و PSD-95 برای بررسی تشکیل سیناپس‌ها به کار می‌روند و برخی مطالعات هیستوپاتولوژیک و تصویربرداری نشان داده‌اند که تراکم سیناپسی در دوران پری‌ناتال و اوایل پس از تولد به سرعت افزایش می‌یابد. شکل‌گیری شبکه‌های ابتدایی عصبی در این دوره پایه توانایی‌های عصبی-حسی و سپس شناختی را فراهم می‌آورد و هر گونه اختلال زمینه‌ای (مثلاً در بیان ژن یا تأثیرات محیطی) می‌تواند الگوی اتصال را تغییر دهد.

۵. میلینه‌سازی و تشکیل مدارهای کارآمد

میلینه‌سازی که توسط الیگودندروسیت‌ها انجام می‌شود، سرعت هدایت عصبی را افزایش می‌دهد و ساختار مدارها را تثبیت می‌کند. برخلاف مراحل قبلی، میلینه‌سازی در بسیاری از نواحی مغزی پس از تولد و تا نوجوانی و حتی اوایل بزرگسالی ادامه می‌یابد؛ این ویژگی باعث می‌شود بلوغ عملکردی بسیاری از مدارها زمان‌بر باشد و براساس داده‌های تکاملی، میلینه‌سازی در نئوکورتکس انسانی نسبت به سایر گونه‌ها طولانی‌تر و گسترده‌تر است. اختلالات در میلینه‌سازی یا تأخیر آن می‌تواند منجر به کاهش کارایی سیناپسی و مشکلات عملکردی حرکتی یا شناختی شود.



عوامل محیطی پیش از زایمان مانند سوء تغذیه مادر، استرس، مصرف الکل یا برخی داروها و همچنین عفونت های مادری می توانند با تداخل در نورون زایی، مهاجرت یا سیناپتوژنز، منجر به تغییرات ساختاری و عملکردی در مغز جنین شوند. همچنین تولد زودرس و آسیب های پری ناتال می توانند مراحل حساس توسعه عصبی را مختل کنند و خطر ناتوانی های عصبی-رشدی را افزایش دهند. به همین دلیل، شناخت دقیق مراحل حساس تکوین و زمان بندی مداخلات محافظتی بالینی اهمیت بالایی دارد.

REFERENCES

1. Stiles J, Jernigan TL. The basics of brain development. *Neuropsychology Review*. 2010;20(4):327-348.
2. Silbereis JC, Pochareddy S, Zhu Y, Li M, Sestan N. The cellular and molecular landscapes of the developing human central nervous system. *Neuron*. 2016;89(2):248-268.
3. Wilke J, Macchi V, De Caro R, Stecco C. Fascia thickness, aging and flexibility: is there an association? *Journal of Anatomy*. 2019;234(1):43-49.
4. Tau GZ, Peterson BS. Normal development of brain circuits. *Neuropsychopharmacology*. 2010;35(1):147-168.
5. Hansen DV, Lui JH, Parker PR, Kriegstein AR. Neurogenic radial glia in the outer subventricular zone of human neocortex. *Nature*. 2010;464(7288):554-561.
6. Guerrini R, Parrini E. Neuronal migration disorders. *Neurobiology of Disease*. 2010;38(2):154-166.
7. Miller DJ, Duka T, Stimpson CD, Schapiro SJ, Baze WB, McArthur MJ, et al. Prolonged myelination in human neocortical evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2012;109(41):16480-16485.
8. Kostovic I, Jovanov-Milošević N. The development of cerebral connections during the first 20-45 weeks' gestation. In: *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. 2006;11(6):415-422. Elsevier.






فاطمه خسروی - دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری

مراحل مختلف خواب و فعالیت مغزی

خواب به حالتی از عدم هوشیاری اطلاق می‌شود که با تحریکات حسی یا دیگر تحریکات می‌توان فرد را از آن خارج کرد. خواب در گونه‌های پستانداران به طور کلی به دو نوع متمایز تقسیم می‌شود: خواب با حرکات سریع چشم (REM) و خواب بدون حرکات سریع چشم (NREM) یا خواب با امواج آهسته (SWS).

در پریمات‌ها و گربه‌ها، خواب NREM خود به چهار زیرمرحله (۱ تا ۴) تقسیم می‌شود که به ترتیب نشان‌دهنده افزایش عمق خواب هستند (HORI ET AL., 2001). در خواب NREM، سیستم‌های کولینرژیک زیرقشری در ساقه مغز و مغز پیشین به طور معنی‌داری فعالیت کمتری پیدا می‌کنند (HOBSON ET AL., 1975). همچنین میزان شلیک نورون‌های سروتونرژیک رافه و نورون‌های نورآدرنرژیک لوکوس سرلئوس نیز نسبت به سطوح بیداری کاهش می‌یابد (SHIMA ET AL., 1986). بیشتر خواب فرد در شب را خواب با امواج آهسته تشکیل می‌دهد. در طی آن امواج مغزی بسیار قوی و کم فرکانس هستند. این خواب آرام‌بخش بوده و با کاهش تون عروق محیطی، کاهش تنفس و کاهش سرعت متابولیت پایه همراه است (سپهری و همکاران، 1394). در طول خواب REM، نورون‌های آمینرژیک رافه و لوکوس سرلئوس به شدت مهار می‌شوند درحالی که سیستم‌های کولینرژیک در مقایسه با بیداری به همان اندازه یا بیشتر فعال می‌شوند (MARROSU ET AL., 1995). خواب 25% REM از کل زمان خواب را به خود اختصاص داده و هر 90 دقیقه به مدت 5 تا 30 دقیقه در یک خواب شبانه تکرار می‌شود. هرچه فرد خواب‌آلوده‌تر باشد دوره این خواب کاهش می‌یابد. در این مرحله از خواب، بیدار کردن فرد با محرک‌های حسی بسیار دشوارتر از خواب با امواج آهسته است، تونوس عضلانی بدن کاهش یافته، ضربان قلب و تنفس نامنظم می‌شوند و حرکات عضلانی نامنظمی در طی این نوع از خواب رخ می‌دهد که حرکات سریع چشم‌هایک نمونه از آن است. در این خواب متابولیسم مغزی افزایش یافته و امواج مغزی مشابه حالت بیداری هستند بنابراین به این نوع از خواب، خواب متناقض (پارادوکسیکال) گفته می‌شود (سپهری و همکاران، 1394).




خواب و تثبیت حافظه

نظریه‌ی سیستم‌های یادگیری مکمل چارچوبی برای درک تعادل میان یادگیری سریع تجربیات خاص و ادغام تدریجی آن‌ها در شبکه‌های دانش موجود فراهم کرد. این نظریه بیان می‌کند که مغز این تعادل را از طریق دو سیستم یادگیری تخصصی برقرار می‌سازد. سیستم اول (هیپوکامپ) است که مسئول یادگیری سریع جزئیات رویدادها و تجربیات فردی است و توانایی دارد بدون ایجاد اختلال در خاطرات قبلی، خاطرات جدید بسازد (جداسازی الگو). سیستم دوم (نئوکورتکس) می‌باشد که مسئول یادگیری تدریجی و ساختاریافته‌ی دانش درباره‌ی محیط است، اطلاعات جدید را به مرور زمان در شبکه‌های موجود ادغام می‌کند و به تثبیت و پایدارسازی خاطرات کمک می‌کند. این سیستم دوگانه از بروز پدیده‌ای به نام تداخل فاجعه‌آمیز جلوگیری می‌کند؛ حالتی که در آن یادگیری‌های جدید می‌توانند دانش قبلی را مختل یا نابود کنند (MCCLELLAND ET AL., 1995).

رابطه‌ی خواب و حافظه نخستین بار در سال ۱۸۸۵ توسط ابینگهاوس مطرح شد. او دریافت که پس از خواب، فراموشی اطلاعات تازه آموخته شده کمتر از زمان بیداری است. شواهد نشان می‌دهند که خواب نقش فعالی در تقویت و پایدارسازی حافظه دارد؛ فرآیندی که به آن تثبیت حافظه وابسته به خواب گفته می‌شود (WEIGHALL & KELLAR, 2023).

به بیان ساده، خواب می‌تواند اطلاعات تازه آموخته شده و ضعیف را به خاطراتی قوی، پایدار و یکپارچه با دانش موجود در حافظه‌ی بلندمدت تبدیل کند. به‌طورکلی خواب یادآوری را نسبت به بیداری افزایش می‌دهد و این سودمندی بسته به نوع حافظه و مرحله‌ی خواب متفاوت است. برای مثال، یادآوری فهرست‌های جفت‌واژه (حافظه اظهاری) بیشتر در اوایل خواب بهبود می‌یابد، در حالی که مهارت‌های ردیابی آینه‌ای (حافظه رویه‌ای) بیشتر در اواخر خواب بهبود پیدا می‌کند (WEIGHALL & KELLAR, 2023).



شکل ۲. مراحل سیکل‌های خواب (EUGENE AND MASIAC 2015)



خواب فرآیند تبدیل اطلاعات جدید را تسهیل می‌کند. این اطلاعات در آغاز به شکلی شکننده و پراکنده در هیپوکامپ رمزگذاری می‌شوند و سپس طی خواب به خاطراتی قوی، پایدار و یکپارچه با دانش موجود در حافظه‌ی بلندمدت (LTM) تبدیل می‌گردند. به گونه‌ای که با گذر زمان، اطلاعات از حالت اولیه و آسیب‌پذیر در هیپوکامپ به ساختارهای پایدارتر در نئوکورتکس انتقال می‌یابند. تعامل پویا میان هیپوکامپ و نئوکورتکس در طول خواب برای تثبیت خاطرات جدید حیاتی است (STICKGOLD, 2005).

رویا و پردازش احساسات


خواب فرآیند تبدیل اطلاعات جدید را تسهیل می‌کند. این اطلاعات در آغاز به شکلی شکننده و پراکنده در هیپوکامپ رمزگذاری می‌شوند و سپس طی خواب به خاطراتی قوی، پایدار و یکپارچه با دانش موجود در حافظه‌ی بلندمدت (LTM) تبدیل می‌گردند. به گونه‌ای که با گذر زمان، اطلاعات از حالت اولیه و آسیب‌پذیر در هیپوکامپ به ساختارهای پایدارتر در نئوکورتکس انتقال می‌یابند. تعامل پویا میان هیپوکامپ و نئوکورتکس در طول خواب برای تثبیت خاطرات جدید حیاتی است (STICKGOLD, 2005).

خاطرات هیجانی زمانی شکل می‌گیرند که موجود زنده با محرکی مواجه شود که احساسات را برمی‌انگیزد. در طول این مواجهه، شاخه‌ی سمپاتیک دستگاه عصبی خودکار (ANS) فعال می‌شود و مجموعه‌ای از مواد شیمیایی عصبی از جمله نورآدرنالین آزاد می‌شود. این فعال‌سازی شیمیایی عصبی، نشانه‌ای منحصر به فرد برای رمزگذاری خاطرات هیجانی است (WALKER & VAN DER HELM, 2009). فرضیه‌ی خواب برای فراموشی و خواب برای به‌خاطر سپاری (SFSR) بیان می‌کند که محیط عصب‌زیستی ایجاد شده در خواب سرشار از مرحله‌ی REM باعث جدا شدن محتوای یک خاطره‌ی هیجانی از برانگیختگی عاطفی همراه آن می‌شود. این جداسازی امکان بروز دو اثر متفاوت را فراهم می‌کند: کاهش بار عاطفی خاطره (تضعیف لحن هیجانی) و در عین حال تقویت محتوای آن (LIPINSKA & THOMAS, 2019). خواب REM نقشی محوری در پردازش تجربیات هیجانی و برجسته‌ی زندگی در بیداری ایفا می‌کند و به شکل چشمگیری به تثبیت حافظه‌ی هیجانی کمک می‌کند. فرایندهایی که رؤیا و برجستگی هیجانی در محتوای ذهنی خواب را تنظیم می‌کنند، دارای زیرساخت‌های عصبی مشابهی با آن‌هایی هستند که احساسات را در بیداری کنترل می‌کنند (SCARPELLI ET AL., 2019). دیدن رؤیا می‌تواند هم در طول خواب REM و هم در خواب غیر NREM رخ دهد. به‌ویژه، تجربه‌های رؤیایی (DES) در حدود ۵۰٪ از موارد پس از بیدار شدن از خواب NREM، به‌خصوص از مرحله‌ی دوم خواب، گزارش شده‌است.

در هنگام رؤیا دیدن در مرحله‌ی خواب REM، نواحی مغزی مربوط به هیجان‌ها (سامانه‌ی لیمبیک) و سامانه‌ی پاداش فعال می‌شوند. این فعال‌سازی به مغز کمک می‌کند تا هیجان‌ها و تجربه‌های عاطفی روز را در حالت استراحت دوباره پردازش کرده و بین آن‌ها ارتباط‌های تازه‌ای برقرار کند (SCARPELLI ET AL., 2019). باید توجه داشت که بیشتر نواحی مغزی درگیر در رمزگذاری و تثبیت حافظه‌های هیجانی در طول خواب REM به‌شدت فعال هستند. به‌ویژه، فعالیت بیشتر مجموعه‌ی آمیگدال، ساختار هیپوکامپ و قشر کمربندی قدامی (ACC) در خواب REM نسبت به بیداری یا خواب NREM، می‌تواند شدت هیجانی رؤیاهایی را توضیح دهد که پس از بیدار شدن از این مرحله گزارش می‌شوند (SCARPELLI ET AL., 2019).



Brain Waves During Sleep

Type and Range		When It Occurs
Beta Waves 13 - 30 Hz		While awake
Alpha Waves 8 - 13 Hz		While relaxed or sleepy
Theta Waves 4 - 8 Hz		During stage 1 and 2 (light) sleep
Delta Waves 1 - 4 Hz		During stage 3 (deep) sleep

شکل 3. امواج مغزی در طول خواب

REFERENCES





حانیه شریفی - کارشناسی ارشد ژنتیک

ترمیم DNA یکی از فرایندهای بنیادین در حفظ سلامت و پایداری ژنومی سلول‌های عصبی است. نورون‌ها به دلیل طول عمر زیاد و فعالیت متابولیکی بالا، نسبت به آسیب‌های ژنتیکی بسیار حساس هستند. آسیب‌های ترمیم‌نشده در مولکول DNA می‌توانند موجب اختلال در عملکرد سلولی و در نهایت منجر به بروز بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی شوند.

ترمیم DNA برای حفظ سلامت مغز و پایداری عملکرد نورونی ضروری است. نورون‌ها به عنوان سلول‌هایی با فعالیت متابولیکی شدید و تقسیم سلولی محدود، در معرض خطر بالای تجمع آسیب‌های ژنتیکی قرار دارند. این آسیب‌ها می‌توانند در اثر عوامل مختلفی از جمله سموم محیطی، فرآورده‌های جانبی متابولیسم، استرس اکسیداتیو، و تغییرات شیمیایی خودبه‌خودی ایجاد شوند. از آنجاکه نورون‌ها توان تقسیم و جایگزینی مکرر ندارند، هرگونه آسیب ترمیم‌نشده در DNA می‌تواند به تدریج منجر به اختلال عملکرد نورونی، از دست رفتن اتصالات سیناپسی و در نهایت مرگ سلولی شود.

ترمیم DNA: سپر حیاتی مغز در برابر طوفان ژنتیکی

ارتباط ترمیم DNA با اختلالات مغزی

اختلال در مسیرهای ترمیم DNA با بروز طیف گسترده‌ای از بیماری‌های عصبی و روان‌پزشکی مرتبط دانسته شده است. مطالعات نشان داده اند که کارایی ناکافی در سیستم‌های ترمیمی می‌تواند زمینه‌ساز تجمع آسیب‌های DNA در نورون‌ها و آغاز فرایندهای تحلیل عصبی باشد. بیماری‌هایی نظیر آلزایمر، پارکینسون و اسکیزوفرنی با ناهنجاری در مسیرهای ترمیمی از قبیل بازسازی شکست‌های دورشته‌ای و برش بازسازی قاعده ارتباط دارند. جهش در ژن‌های دخیل در این مسیرها ممکن است موجب اختلال در عملکرد نورونی، مرگ زودرس سلول‌های عصبی و کاهش تدریجی توانایی‌های شناختی و حرکتی گردد.

منشأ آسیب‌های DNA در سلول‌های عصبی

سلول‌های عصبی در طول حیات خود به‌طور مداوم در معرض عوامل آسیب‌زای متعددی قرار دارند. گونه‌های فعال اکسیژن که طی فرایندهای طبیعی متابولیسم تولید می‌شوند، از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده آسیب اکسیداتیو در DNA محسوب می‌گردند. علاوه بر آن، نور فرابنفش، ترکیبات شیمیایی محیطی و برخی داروها می‌توانند منجر به بروز شکست‌های تکرشته‌ای و دورشته‌ای در ساختار DNA شوند. از آنجا که مصرف اکسیژن در مغز بسیار بالا است، احتمال بروز آسیب‌های اکسیداتیو در بافت عصبی نسبت به سایر بافت‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، کارایی سیستم‌های ترمیم DNA نقشی اساسی در حفظ یکپارچگی ژنومی و عملکرد نورونی ایفا می‌کند.



ترمیم مؤثر DNA نقش محوری در حفظ سلامت عصبی و جلوگیری از بروز اختلالات تحلیل‌برنده مغز دارد. حفظ کارایی مسیرهای ترمیم ژنتیکی برای جلوگیری از تجمع آسیب‌های مولکولی، تضمین‌کننده عملکرد پایدار شبکه‌های عصبی و سلامت مغز در طول زندگی است. بررسی دقیق سازوکارهای مولکولی دخیل در ترمیم DNA می‌تواند راهگشای توسعه‌ی راهبردهای درمانی نوین برای پیشگیری یا کندسازی روند بیماری‌های نورودژنراتیو باشد.

ماشین‌های ترمیم‌کننده:

انواع آنزیم‌های DNA و جادوی

عملکردشان در سلول‌های عصبی

ترمیم DNA در سلول‌های عصبی به مجموعه‌ای از آنزیم‌های تخصصی متکی است که انواع مختلف آسیب‌های DNA را شناسایی، پردازش و اصلاح می‌کنند تا بقا و عملکرد صحیح نورون‌ها حفظ شود. مهم‌ترین مسیرهای ترمیم شامل ترمیم برش بازسازی قاعده، ترمیم برش بازسازی نوکلئوتید و ترمیم شکست‌های دورشته‌ای DNA از طریق اتصال انتهای غیرهمولوگ و ترمیم همولوگ است.

ترمیم DNA در سلول‌های عصبی

مسیر BER در نورون‌ها نقش غالب دارد و با عملکرد DNA گلیکوزیلازها آغاز می‌شود. آنزیم‌هایی نظیر OGG1، NTH1 و NEIL1/2/3، بازهای اکسیدشده یا غیرطبیعی را که عمدتاً در نتیجه‌ی استرس اکسیداتیو در سلول‌های عصبی ایجاد می‌شوند، شناسایی و حذف می‌کنند. هر یک از این گلیکوزیلازها دارای ویژگی اختصاصی نسبت به نوع خاصی از آسیب هستند. پس از برداشت باز آسیب‌دیده، آنزیم APE1 جایگاه بدون باز را پردازش کرده و سپس DNA پلی‌مراز بتا (POLB) نوکلئوتید صحیح را جایگزین می‌کند. در مرحله‌ی نهایی، لیگاز III شکست ایجادشده را به‌طور کامل ترمیم و مولکول DNA را مهر و موم می‌نماید.

ترمیم برش بازسازی قاعده (BER)

در نورون‌ها، مسیر اصلی برای ترمیم شکست‌های دورشته‌ای اتصال انتهای غیرهمولوگ (NHEJ) است. آنزیم‌های این مسیر انتهای شکسته‌شده‌ی DNA را شناسایی، پردازش و دوباره به هم متصل می‌کنند. علاوه بر این، مجموعه‌های پروتئینی تخصصی مانند NPAS4-NUA4 در محل شکست‌های DNA ناشی از فعالیت‌های نورونی تجمع می‌یابند و با هماهنگی فرآیند ترمیم در مجاورت ژن‌های فعال، از عملکرد سلولی محافظت می‌کنند.

ترمیم شکست‌های دورشته‌ای DNA

مسیر NER برای حذف آسیب‌های حجیم و تغییر شکل‌دهنده‌ی مارپیچ DNA طراحی شده است و شامل دو زیرشاخه است: ترمیم ژنوم عمومی و ترمیم هم‌زمان با رونویسی.



مسیر دوم برای حفظ فعالیت رونویسی در نورون‌ها حیاتی است. نقص در آنزیم‌های NER، همانند موارد مشاهده‌شده در سندرم هاکای COCKAYNE و XERODERMA PIGMENTOSUM، با بروز علائم شدید عصبی از جمله تحلیل رفتگی عصبی و عقب‌ماندگی شناختی همراه است.

ترمیم برش بازسازی نوکلئوتید (NER)



شبکه‌ی ترمیم ژنتیکی در نورون‌ها

به‌طور کلی، آنزیم‌هایی همچون APE1، POLB، NEIL1-3، OGG1، انواع DNA لیگازها و پروتئین‌های مسیرهای NER و NHEJ، شبکه‌ای پویا در سلول‌های عصبی ایجاد می‌کنند که آسیب‌های DNA را شناسایی، حذف و بازسازی می‌کند. کاهش فعالیت یا اختلال در عملکرد هر یک از این اجزا موجب افزایش نرخ جهش، تحلیل عصبی، و بروز اختلالات نوروتکاملی می‌شود. این شواهد بر اهمیت بنیادی کارایی ترمیم DNA در حفظ سلامت و عملکرد مغز در طول زندگی تأکید دارند.



افق‌های نوین درمان:

مهندسی ژنتیک و AI در تقویت

ترمیم DNA برای مغز سالم

راهبردهای درمانی نو ظهور برای تقویت ترمیم DNA در سلول‌های عصبی

پیشرفت‌های نوین در حوزه‌های مهندسی ژنتیک، طراحی دارو و هوش مصنوعی، چشم‌اندازهای تازه‌ای را برای تقویت آنزیم‌های ترمیم DNA و حفظ سلامت عصبی فراهم کرده‌اند. امروزه سامانه‌های ویرایش ژن "CRISPR-CAS9" امکان اصلاح هدفمند مسیرهای ترمیم DNA را در نورون‌ها فراهم می‌سازند و دقت اصلاح ژن را در سلول‌های عصبی غیرتقسیمی (POSTMITOTIC) افزایش می‌دهند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که بهینه‌سازی فاکتورهای ترمیم DNA می‌تواند موجب ارتقای کارایی ویرایش ژن گردد؛ علاوه بر این، استفاده از تنظیمات سطح RNA و روش‌های تحویل یکپارچه، امکان کنترل و تعدیل پروتئین‌های ترمیمی‌ای را فراهم کرده است که پیش‌تر به‌عنوان اهداف درمانی (غیرقابل دارو) شناخته می‌شدند.



Neuro Biom

داروهای نسل جدید


برای تعدیل مسیرهای ترمیم DNA



درمان‌های دارویی نوین با هدف دستکاری فعالیت مسیرهای ترمیم DNA برای دستیابی به منافع بالینی طراحی شده‌اند. به عنوان نمونه، مهارکننده‌های آنزیم‌های ترمیمی پاتولوژیک می‌توانند تومورهای مغزی را نسبت به داروهای شیمی درمانی حساس‌تر سازند، در حالی که ترکیباتی که باعث افزایش کارایی ترمیم DNA می‌شوند، قادرند از تغییرات تحلیل‌برنده‌ی عصبی بکاهند. پژوهشگران از کمبودهای ذاتی ترمیم DNA مانند فقدان MGMT در گلیوماها بهره گرفته‌اند تا سلول‌های توموری را به طور انتخابی هدف قرار دهند و از بین ببرند؛ رویکردی که پارادایم جدیدی را در درمان مبتنی بر استفاده از تفاوت‌های ترمیم ژنتیکی میان سلول‌های سالم و بیمار ایجاد کرده است.

نقش هوش مصنوعی در ارتقای ترمیم ژنتیکی

هوش مصنوعی به سرعت در حال دگرگون کردن چشم انداز تقویت ترمیم DNA است و با مدل سازی و پیش بینی نتایج ترمیم سلولی، دقت مداخلات ژنتیکی را افزایش می دهد. الگوریتم‌هایی نظیر PYTHIA توانایی تحلیل میلیون‌ها الگوی ترمیم DNA را در پاسخ به ویرایش‌های CRISPR دارند و بر اساس آن، طراحی الگوهای ترمیمی بهینه برای ویرایش دقیق ژن‌ها را هدایت می کنند. پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی اکنون امکان مشاهده ی برخی (REAL-TIME) فرآیندهای ویرایش ژن و برچسب گذاری پروتئین‌ها را در بافت‌های زنده ی مغزی فراهم می کنند. ادغام فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک موجب دستیابی به اصلاحات ژنی قابل اعتماد و کارآمد در نورون‌های غیرتقسیمی شده است. دستاوردی که نقطه عطفی در حوزه ی نورोजنتیک یا ژنتیک عصبی به شمار می رود.



Neuro Biom



نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در مجموع، فناوری‌های نوظهور در زمینه‌ی مهندسی ژنتیک، طراحی دارو و هوش مصنوعی، نویدبخش توسعه‌ی درمان‌های شخصی‌سازی‌شده هستند که با حفظ یا بازگرداندن عملکرد ترمیم DNA در سلول‌های عصبی، می‌توانند از بروز یا پیشرفت اختلالات مغزی ناشی از بی‌ثباتی ژنتیکی جلوگیری کنند. این همگرایی میان زیست‌فناوری و علوم محاسباتی می‌تواند مسیر درمان بیماری‌های نورودژنراتیو و بازسازی عصبی را دگرگون سازد.

REFERENCES






فاطمه سادات مجلسی- ارشد میکروبیولوژی میکروارگانیسم های بیماری زا

ویژگی های مغزی در REM (نوع امواج مغزی الگوی بیداری مانند و مصرف


این افزایش ها به ویژه در جریان «جهش های عروقی» دیده می شوند که در هر دوره REM حدود ۴ تا ۶ بار رخ می دهند، از تالاموس شروع شده و به هیپوکامپ و قشر مغز گسترش می یابند. این جهش ها نشان دهنده مصرف انرژی بالای مغز هستند و این دیدگاه را به چالش می کشند که خواب فقط حالت استراحت و بازسازی است. در واقع، این وضعیت با افزایش تولید گرمای متابولیکی و بالا رفتن دمای مغز همراه است، حتی با وجود اینکه تنظیم دمای بدن در REM متوقف می شود. نرخ متابولیسم مغز برای گلوکز و لاکتات در REM مشابه حالت بیداری است. شاخص اکسیژن-گلوکز نیز به حدود ۶ یا بیشتر می رسد که نشان دهنده تغییر به سمت متابولیسم اکسیداتیو برای پشتیبانی از این فعالیت شدید است

خواب REM (حرکت سریع چشم) با ویژگی های خاصی در فعالیت مغز شناخته می شود که نشان دهنده افزایش فعالیت عصبی است. در این مرحله، امواج اصلی مغز شامل نوسان های تتا (حدود ۶ تا ۱۰ هرتز) و نوسان های گاما (حدود ۵۰ تا ۱۵۰ هرتز) هستند. این امواج باعث ایجاد الگوی در نوار مغزی (EEG) می شوند که کم دامنه، نامنظم و ترکیبی است و شباهت زیادی به حالت بیداری دارد. برخلاف مراحل دیگر خواب که امواج آهسته و هماهنگ دیده می شود، در REM فعالیت نورون ها سریع و نامنظم است. نرخ شلیک نورون ها در این مرحله تقریباً مشابه حالت بیداری آرام است. این موضوع به دلیل فعال شدن دوباره سیستم کولینرژیک (مرتبط با استیل کولین) و همزمان خاموش شدن نورون های نورآدرنرژیک رخ می دهد. نتیجه این است که مغز می تواند بدون دریافت ورودی های حسی بیرونی، اطلاعات را درونی پردازش کند. این الگوی شبیه به بیداری به مغز اجازه می دهد تا درگیر فعالیت های پیچیده و درونی شود، فعالیت هایی مثل دیدن رؤیاهای زنده و واضح. REM از نظر مصرف انرژی فشار متابولیکی بالایی به مغز، حتی به اندازه یا بیشتر از حالت بیداری وارد می کند. پژوهش هایی که با استفاده از تصویربرداری فراصوتی در مدل های حیوانی انجام شده اند، نشان داده اند که فعالیت ریتمی تتا-گاما با افزایش قابل توجه حجم خون مغزی همراه است.




(آمیگدالا، هیپوکامپ قشر پیش پیشانی و ارتباط آن با رویاها)

در طول خواب REM، الگوهای متمایزی از فعال سازی و غیرفعال سازی در مغز پدیدار می شوند که به ویژه آمیگدال، هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی را درگیر می کنند و به طور جمعی بر محتوای رویا و پردازش هیجانی تأثیر می گذارند. آمیگدال و هیپوکامپ، که بخشی از ساختارهای لیمبیک و لوب گیجگاهی میانی هستند، فعالیت چشمگیری نشان می دهند. شواهدی از افزایش جریان خون منطقه ای مغز و متابولیسم گلوکز در مطالعات توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) این امر را تأیید می کند. این بیش فعالی در آمیگدال به شدت هیجانی رویاها کمک می کند و دامنه ای از عواطف همچون ترس، اضطراب، شادی و خشم را دربرمی گیرد، در حالی که هیپوکامپ از فرایندهای مرتبط با حافظه پشتیبانی می کند. هرچند رویاها اغلب فاقد یادآوری منسجم رویدادهای اپیزودیک هستند که این امر ناشی از تعامل با سایر نواحی است. این فعال سازی ها موجب می شوند بازمانده های ادراکی تجربه های بیداری در بافت های تازه ی رویا ادغام شوند و ماهیت زنده و غنی از حواس رویاهای مرتبط با REM را تقویت کنند. در مقابل، قشر پیش پیشانی، به ویژه زیرناحیه های دورسولترال و اربیتوفرانیتال، در طول خواب REM کاهش فعالیت قابل توجهی نشان می دهند که منجر به کاهش کنترل ارادی، خودآگاهی و تفکر بازتابی می شود. این کاهش فعالیت، ویژگی های کلیدی رویا را توضیح می دهد؛ از جمله پذیرش توهم گونه ی رویدادهای غیرمنطقی، تغییر ناگهانی صحنه ها و اختلال در فرایندهای حافظه ای، زیرا قشر پیش پیشانی دورسولترال برای حافظه ی کاری و کارکردهای اجرایی حیاتی است.



تقویت حافظه، تنظیم هیجان و اهمیت آن برای سلامت مغز

این امر به کاهش شدت هیجانی ذهنی هنگام یادآوری، تقویت اتصال پیش‌پیشانی-آمیگدال و بهبود تمایزگذاری اهمیت هیجانی منجر می‌شود و از واکنش‌پذیری بیش از حد جلوگیری کرده و پاسخ‌های سازگارانه به تهدیدها را تسهیل می‌کند. اختلال در این کارکرد، مانند آنچه در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) دیده می‌شود، به برانگیختگی هیجانی پایدار ناشی از شکست در خاموشی منجر می‌گردد. اهمیت خواب REM برای سلامت مغز در ارتقای هموستاز عصبی، ثبات هیجانی و تاب‌آوری شناختی نهفته است. این مرحله از خواب به جابه‌جایی حافظه‌ی اظهاری از هیپوکامپ به نئوکورتکس کمک می‌کند. مراحل غیر REM را در کاهش مقیاس سیناپسی تکمیل می‌نماید و با بازگرداندن تون نورآدرنژیک، خطر ابتلا به اختلالاتی مانند افسردگی و اضطراب را کاهش می‌دهد. مدل‌های زیست‌فیزیکی نشان می‌دهند که حالت فیزیولوژیک منحصربه‌فرد REM تغییرات پلاستیسیته‌ی حیاتی برای خاموشی ترس را امکان‌پذیر می‌سازد و پیامدهای درمانی برای نورومدولاسیون در شرایطی دارد که خواب دچار اختلال است.



خواب REM کارکردهای شناختی اساسی به ویژه در تقویت حافظه، تنظیم هیجان و حفظ سلامت کلی مغز را بر عهده دارد. در ارتباط با حافظه، خواب REM به تحکیم خاطرات هیجانی کمک می‌کند و عناصر اپیزودیک و اظهاری را بیش از خاطرات خنثی تقویت می‌نماید. این امر از طریق نوسان‌های تتا (۴ تا ۷ هرتز) که تعاملات هیپوکامپ-پیش‌پیشانی را افزایش می‌دهند، رخ می‌دهد. این فرایند شامل ارتباط ریتمیک در باند تتا میان قشر پیش‌پیشانی میانی و آمیگدال است که با سازوکارهای وابسته به زمان شلیک نورونی، انعطاف‌پذیری سیناپسی را ارتقا داده و خاطرات مرتبط با ترس را تحکیم می‌کند و آن‌ها را در شبکه‌های موجود برای نگهداری بلندمدت ادغام می‌سازد. خواب REM غنی در ساعات پایانی شب پیش‌بینی‌کننده‌ی یادآوری بهتر تجربه‌های برانگیزاننده است و این مزایا تا سال‌ها باقی می‌ماند که نقش آن را در رمزگذاری سازگارانه‌ی حافظه برجسته می‌سازد. در زمینه‌ی تنظیم هیجان، خواب REM واکنش‌پذیری هیجانی مغز را بازتنظیم می‌کند. این کار با کاهش توانمندی پاسخ‌های آمیگدال به محرک‌های هیجانی پیشین در محیطی با سطح پایین نورآدرنالین انجام می‌شود. در نتیجه، بار هیجانی بدنی کاهش می‌یابد، در حالی که هسته‌های اطلاعاتی حفظ می‌شوند. فرایندی که در مدل «خوابیدن برای فراموش کردن و خوابیدن برای به یاد سپردن» توصیف شده است.



پیامدهای کمبود یا اختلال در خواب REM

(اثراتی مانند اختلال حافظه، مشکلات خلقی، تضعیف سیستم ایمنی و افزایش خطر بیماری های عصبی)

کمبود یا اختلال در خواب REM پیامدهای عمیقی به همراه دارد. از جمله اختلال حافظه، مشکلات خلقی، تضعیف سیستم ایمنی و افزایش خطر ابتلا به بیماری های عصبی. اختلال حافظه ناشی از برهم خوردن فرایندهای تحکیم است. کاهش REM جابه جایی حافظه های اظهاری و اپیزودیک را مختل می کند، توان تقویت درازمدت (LTP) در نواحی هیپوکامپ را کاهش می دهد و به کمبودهایی در حافظه فضایی، کاری و ترس بافتی منجر می شود. همان طور که در آزمون هایی مانند ماز آبی موریس مشاهده شده است. این وضعیت با کاهش سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و تغییر در انعطاف پذیری سیناپسی تشدید می شود و به افت شناختی منجر می گردد که در بیماران پس از سکته و سالمندان قابل مشاهده است. مشکلات خلقی به صورت اختلال در تنظیم هیجان، افزایش اضطراب و بالا رفتن خطر افسردگی بروز می کنند. این امر ناشی از REM افزایش واکنش پذیری آمیگدال، کاهش اتصال پیش پیشانی و بی نظمی در فعالیت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال است. محرومیت از نوسان هیجانی، تکانشگری و تداوم عاطفه منفی را تقویت می کند و از طریق شکست در خاموشی ترس و برانگیختگی مکرر مرتبط با تروما، به اختلالاتی مانند PTSD دامن می زند.

تضعیف سیستم ایمنی از طریق افزایش سایتوکاین های پیش التهابی (مانند IL-6 و TNF-A)، کاهش فعالیت سلول های کشنده ی طبیعی (NK CELLS) و تغییر پاسخ های T-HELPER به سمت غلبه ی TH2 رخ می دهد که التهاب مزمن و استرس اکسیداتیو را تقویت می کند. این وضعیت حساسیت به عفونت ها را افزایش می دهد، پاسخ به واکسیناسیون را مختل می سازد و میکروبیوتای روده را برهم می زند و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری های خودایمنی و اختلالات متابولیک را بالا می برد.

در نهایت، اختلال در REM خطر بیماری های عصبی را افزایش می دهد؛ از جمله بیماری آلزایمر از طریق اختلال در پاکسازی گلیفاتیکی آمیلوئید-بتا و تاو که منجر به تجمع پلاک و التهاب عصبی می شود. بیماری پارکینسون از طریق تجمع آلفا-سینوکلئین و استرس اکسیداتیو و سکته مغزی با وخامت پیامدهای انفارکتوس و کاهش بهبودی عملکردی. ارتباطات اپیدمیولوژیک همچنین شامل افزایش مرگ و میر، زوال عقل و شرایطی مانند ام اس و صرع است، جایی که از دست رفتن REM برانگیختگی نورونی و تاخوردگی نادرست پروتئین ها را تشدید می کند.

REFERENCES




زیست‌شناسی نوین

دنیای زیست‌شناسی نوین مرزهای کلاسیک علم را درنوردیده است. از تصویربرداری‌های سه‌بعدی و FMRI تا تعامل شگفت‌انگیز میان هوش مصنوعی و مغز انسان، پژوهش‌های امروز تصویری تازه از ذهن و ماده ارائه می‌دهند. در این بخش، از فناوری‌هایی می‌گوییم که ذهن را به داده و داده را به فهم تبدیل کرده‌اند؛ جایی که علم، فلسفه و مهندسی در هم تنیده‌اند تا معنای آگاهی را بازتعریف کنند.



تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی یا FMRI یک تکنیک پیشرفته و غیرتهاجمی در تصویربرداری عصبی بر پایه پدیده ای به نام "اثر وابسته به سطح اکسیژن خون" (BOLD) است. این پدیده اولین بار توسط سیجی اوگاوا در اوایل دهه ۱۹۹۰ معرفی شد، که اساس فیزیولوژیک تصویربرداری را تشکیل می دهد. این اثر به محققان و پزشکان امکان می دهد تا فعالیت های مغز را به صورت غیر مستقیم و با قدرت تفکیک فضایی بالاتری مشاهده نمایند. به صورت کلی این روش بر پایه اصول فیزیکی تشدید مغناطیسی و تغییرات فیزیولوژیک مغز استوار است.

برای مثال هنگام تفکر، نورو ننگاری از که درگیر پردازش یا انجام آن فعالیت ذهنی خاص مثلاً تفکر، تصمیم گیری، دیدن، شنیدن یا حرکت دادن بخشی از بدن می باشد به علت تشدید فعالیت عصبی، به انرژی بیشتری نیاز دارند. در پاسخ به این نیاز، عروق مغز خون بیشتری را به ناحیه فعال منتقل می کند. این پاسخ که با تاخیر در حد چند ثانیه رخ می دهد "پاسخ همودینامیک" می نامند. در نتیجه ی چنین تغییراتی، خواص مغناطیسی خون نیز به واسطه وجود اکسی هموگلوبین و دیوکسی هموگلوبین تغییر کرده و FMRI تغییرات در میزان اکسیژن رسانی خون را ردیابی می کند. این تکنیک به پزشکان کمک میکند، روند را غیر مستقیم پایش نمایند. اصول کار تصویربرداری در شکل ۱-۱ آورده شده است.



شکل ۱-۱




تکنولوژی های پیشرفته در تصویربرداری مغزی و قابلیت های نوین

یکی از پیشرفت های برجسته در FMRI، گذر از نقشه برداری فعال سازی به نقشه برداری اتصالات مغزی است. در این رویکرد، به جای تمرکز بر فعالیت منفرد یک ناحیه خاص، بر تعاملات و هماهنگی میان نواحی مختلف مغز تأکید می شود. تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در حالت استراحت همچنین یکی از روش های پیشرفته برای ثبت فعالیت خودبه خودی مغز در شرایطی است که فرد هیچ وظیفه خاصی انجام نمی دهد. تحلیل داده های حاصل از این روش نشان دهنده الگوهای هماهنگ و هم زمان فعالیت در نواحی مختلف مغز، حتی در حالت استراحت، است. شبکه های مغزی در حالت استراحت (RSNS) از طریق بررسی این همزمانی ها شناسایی شده اند و به عنوان شبکه های عملکردی اصلی مغز شناخته می شوند. برجسته ترین این شبکه ها، شبکه حالت پیش فرض است که در فعالیت هایی نظیر خیال پردازی و تفکر خودانعکاسی فعال می شود. در این رویکرد پیشرفته، مغز به عنوان شبکه ای پیچیده از گره ها (نواحی مغزی) و یال ها (ارتباطات عملکردی) مدل سازی می شود که به این نقشه های اتصال، «کانکتوم عملکردی» گفته می شود. دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) با ثبت برش های متوالی از سراسر مغز و ترکیب آن ها، حجمی سه بعدی از ساختار و فعالیت مغزی را در هر لحظه بازسازی می کند. تحلیل اتصالات در این حجم سه بعدی مشخص می سازد کدام گره ها به صورت هم زمان فعال هستند و در نهایت، نقشه عملکردی مغز در مدل سه بعدی آن نمایش داده می شود.

از دیگر روش های نوین در این حوزه، نقشه برداری ساختاری سه بعدی با استفاده از تصویربرداری تانسور انتشار (DTI) است که به عنوان مکملی برای FMRI شناخته می شود. در این روش، با به کارگیری الگوریتم های پیچیده ی رایانه ای موسوم به تراکتوگرافی، مسیرهای انتشار آب در بافت مغز ردیابی شده و مسیرهای اصلی یا سیم کشی فیزیکی مغز به صورت سه بعدی بازسازی می شود. اهمیت این فناوری زمانی آشکار می شود که داده های ساختاری DTI با داده های عملکردی FMRI ترکیب شوند و تصویری جامع از ارتباطات مغزی فراهم آورند.

Transition from fMRI data to FC Graphs



از جمله کاربردهای تحقیقاتی می توان به مطالعه چگونگی فعالیت و تعامل نواحی مختلف مغز، خلاقیت، حافظه، تصمیم گیری، بررسی نحوه رشد و تکامل شبکه های مغزی از کودکی تا پیری و همچنین مقایسه الگوهای اتصالاتی مغز در افراد سالم با گروه های مختلف را نام برد. همچنین در حیطه کارآزمایی های بالینی، می توان به درک و تشخیص بیماری ها از جمله افسردگی، اسکیزوفرنی، اتیسم و آلزایمر که به عنوان اختلالات اتصالاتی (مشکلات در شکل گیری، حفظ یا کارکرد سیناپس ها و شبکه های عصبی است که باعث اختلال در انتقال پیام های عصبی می شود) و برنامه ریزی قبل از عمل جراحی با هدف نقشه برداری از نواحی حیاتی همچون مراکز تکلم یا حرکت در بیمار اشاره نمود، تا کمترین آسیب به نواحی ذکر شده وارد شود.

ارزیابی اثربخشی درمان نیز از جمله کاربردهای بالینی به منظور مقایسه نقشه اتصالاتی مغز بیمار قبل و بعد از درمان و میزان موفقیت درمان را می توان به این مزیت ها اضافه نمود. باید در نظر داشت که ظهور چنین تکنولوژی به پزشکی فرد محور کمک شایانی خواهد کرد.

REFERENCES

- 1_Poldrack, R. A., & Yarkoni, T. (2023). From pixels to principles: a guide to conceptualizing and reviewing neuroimaging results. *Neuron*, 111(8), 1231-1243
- 2_Baillet, S. (2023). A new era for human brain imaging. *Nature Methods*, 20(5), 636-639
- 3_(2022). The state-of-the-art in diffusion MRI of the human brain. *NeuroImage*, 261, 119532.
- 4_Sunaert, S. (2022). Clinical functional MRI: a new era. *The British Journal of Radiology*, 95(1136), 20211189.
- 5_www.researchgate.net/figure/Construction-of-a-functional-brain-network-Functional-MRI-fMRI-provides-a-blood-oxygen_fig2_334017599
- 6_www.nature.com/articles/nmeth.2039https://www.nature.com/articles/nmeth.2039
- 7_journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0289406https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1073/pnas.87.24.9868





علی مومنی-کارشناسی بیوتکنولوژی



هوش مصنوعی (AI) به عنوان شاخه‌ای از علوم کامپیوتر، همواره از عملکرد مغز انسان به عنوان الگو الهام گرفته است. مغز، با ساختار شبکه‌ای از نورون‌ها و قابلیت‌های برجسته پردازش موازی و ویژگی پلاستیسیته، مدل مناسبی را برای طراحی الگوریتم‌های هوشمند فراهم کرده است. به‌ویژه شبکه‌های عصبی مصنوعی که بر پایه ساختار شبکه‌های نورونی توسعه یافته‌اند نمونه‌ای از این الگوبرداری مستقیم هستند که توانسته‌اند در حوزه‌هایی نظیر یادگیری ماشین و شناسایی الگو موفق عمل کنند. از طرف دیگر پیشرفت‌های هوش مصنوعی به دانشمندان علوم اعصاب ابزارهای قدرتمندی برای شبیه‌سازی و آزمون فرضیه‌های مربوط به عملکرد مغز ارائه داده است. مدل‌های محاسباتی AI با امکان شبیه‌سازی فرآیندهای عصبی، در فهم بهتر پیچیدگی‌های مغز و کشف اصول کلی توانمندی‌های شناختی مغز نقش مهمی ایفا می‌کنند. بنابراین، رابطه بین هوش مصنوعی و علوم عصبی دوطرفه و تعاملی است؛ الگوبرداری AI از ساختار مغز، موجب پیشرفت هوش مصنوعی می‌شود و در مقابل، فناوری‌های AI موجب ارتقاء درک ما از عملکرد مغز می‌گردند.

بازخورد هوش مصنوعی به علوم عصبی

این بازخورد هوش مصنوعی به علوم اعصاب نه تنها موجب پیشرفت در درمان و تشخیص بیماری‌ها شده، بلکه در شناخت پایه‌ای نحوه کارکرد مغز موجب تحولات اساسی شده است؛ به طوری که تعامل مستمر بین این دو حوزه به توسعه فناوری‌های نوین نوروساینس و سیستم‌های هوشمند پیچیده کمک می‌کند و افق‌های تازه‌ای در علم اعصاب و هوش مصنوعی گشوده است.

مدل‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به‌ویژه در حوزه‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، با تحلیل حجم عظیمی از داده‌های عصبی و شبیه‌سازی رفتارهای شناختی، امکان فهم بهتر فرآیندهای مغزی را فراهم کرده‌اند. برای مثال، هوش مصنوعی با پردازش داده‌های پیچیده تصویربرداری مغزی، به شناسایی الگوهای مخفی در فعالیت نورونی کمک می‌کند که پیش از این امکان پذیر نبود. این به درک بهتر بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون منجر شده و باعث درمان‌های دقیق و اثرگذارتر شده است. همچنین هوش مصنوعی امکان مدلسازی دقیق‌تر و پیش‌بینی واکنش‌های مغز در شرایط مختلف را فراهم کرده و به دانشمندان کمک می‌کند فرضیه‌های نوین درباره عملکرد ذهن را آزمایش کنند.



NeuroBiom

در آینده شاهد ترکیبی از همکاری نزدیک انسان و هوش مصنوعی به شکل "هوش ترکیبی" خواهیم بود که نقاط قوت هر دورا درهم می آمیزد. این ترکیب باعث افزایش بهره وری، انعطاف پذیری و دقت در تصمیم گیری ها می شود؛ زیرا هوش مصنوعی توانایی پردازش داده های حجیم و انجام وظایف تکراری را دارد، در حالی که هوش انسانی با خلاقیت، قضاوت های پیچیده و تعاملی عاطفی نقش کلیدی ایفا می کند.

پیش بینی ها نشان می دهد که این همگرایی به تحول صنایع مختلف مثل بهداشت، آموزش و حمل و نقل منجر شده و فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می کند، به شرطی که چالش های اخلاقی و اجتماعی آن به خوبی مدیریت شوند. هوش ترکیبی نه جایگزین هوش انسانی است و نه صرفاً یک ابزار، بلکه یک چرخه تعاملی و مکمل است که آینده فناوری و جامعه بشری را شکل خواهد داد.



مقایسه ای میان

عملکرد مغز انسان و هوش مصنوعی

۱. سرعت و دقت

هوش مصنوعی به ویژه در قالب سامانه هایی مانند چت بات ها قادر است حجم عظیمی از داده ها را با سرعت و دقت بسیار بالا پردازش کند. برای نمونه، زمانی که کاربر پرسشی را در یک چت بات مطرح می کند سامانه در زمانی بسیار کوتاه پاسخی دقیق ارائه می دهد. در مقابل، مغز انسان پردازش اطلاعات را به صورت موازی و با بهره گیری از خلاقیت انجام می دهد اما از نظر سرعت پردازش در مقایسه با هوش مصنوعی کندتر است.

۲. خلاقیت و درک عمیق

مغز انسان از توانایی شگرفی در زمینه خلاقیت و درک مفاهیم پیچیده برخوردار است. انسان می تواند احساسات، ظرایف زبانی، کنایه و طنز را درک کند و در موقعیت های جدید تصمیم های مناسب بگیرد. در حالی که هوش مصنوعی هنوز در درک این ابعاد انسانی، به ویژه احساسات و ظرایف معنایی با محدودیت هایی روبه رو است. چت بات ها می توانند در پاسخ گویی سریع به پرسش های تکراری یا ارائه راهنمایی های ساده عملکردی بسیار دقیق و کارآمد داشته باشند. با این حال زمانی که موضوع گفتگو پیچیده یا غیرمنتظره شود، مغز انسان توانایی بیشتری در تحلیل، تشخیص و ارائه واکنش های هوشمندانه و متناسب با موقعیت دارد.



چت‌بات‌ها می‌توانند در پاسخ‌گویی سریع به پرسش‌های تکراری یا ارائه راهنمایی‌های ساده عملکردی بسیار دقیق و کارآمد داشته باشند. با این حال زمانی که موضوع گفتگو پیچیده یا غیرمنتظره شود، مغز انسان توانایی بیشتری در تحلیل، تشخیص و ارائه واکنش‌های هوشمندانه و متناسب با موقعیت دارد.



مقایسه‌ای میان

عملکرد مغز انسان و هوش مصنوعی

۴. مصرف انرژی


مغز انسان با وجود پیچیدگی فوق‌العاده، تنها حدود ۲۰ وات انرژی مصرف می‌کند و قادر است میلیاردها پردازش عصبی را در هر لحظه انجام دهد. در مقابل، سامانه‌های هوش مصنوعی برای انجام پردازش‌های مشابه به منابع محاسباتی و انرژی بسیار بیشتری نیاز دارند.

۳. انعطاف‌پذیری

یکی از ویژگی‌های برجسته مغز انسان، توانایی بالای آن در سازگاری با شرایط جدید است. انسان می‌تواند در مواجهه با تغییرات محیطی یا موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده، رفتار خود را به سرعت تنظیم کند. اما هوش مصنوعی معمولاً برای یادگیری و تطبیق با شرایط تازه، نیازمند حجم زیادی از داده و فرایندهای آموزشی گسترده است.

REFERENCES






تراشه‌های عصبی و واسطه‌های مغز- کامپیوتر

الکترودهای عصبی قابل کاشت (INE) و رابط مغز- کامپیوتر (BCI) بر پایه ثبت و تحریک مستقیم میدان الکتریکی نورون‌ها کار می‌کنند. در طراحی‌های نوین از مواد زیست سازگار با چگالی بالای الکتروود (روی سطح تراشه تعداد زیادی الکتروود در فضای کوچک قرار گرفته‌اند، تا بتوانند از نواحی بیشتری از مغز سیگنال‌ها را ثبت یا تحریک کنند)، مدارهای الکترونیکی کم‌مصرف و روش‌های پیشرفته‌ی رمزگشایی مبتنی بر یادگیری ماشین برای افزایش تفکیک‌پذیری فضایی و زمانی سیگنال‌ها استفاده می‌شود. روش‌های پیشرفته‌ی رمزگشایی مبتنی بر یادگیری ماشین برای افزایش تفکیک‌پذیری فضایی و زمانی سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

محسوب می‌شوند.



علاوه بر ثبت، تراشه‌های عصبی نوین می‌توانند تحریکات الکتریکی یا شیمیایی هدفمند را نیز انجام دهند؛ این دوطرفه بودن، ثبت و تحریک، امکان پیاده‌سازی حلقه‌های بازخورد عصبی را فراهم می‌آورد که برای بازتنظیم الگوهای پاتولوژیک در پارکینسون، افسردگی مقاوم و تشنج به کار می‌رود. توسعه فناوری‌های محفظه‌بندی مقاوم به نفوذ و چارچوب‌های اخلاقی- حقوقی برای حفاظت از داده‌های عصبی و تضمین رضایت آگاهانه، پیش‌نیاز گسترش ایمن این سیستم‌ها می‌باشد.




روش‌های بازتوانی عصبی

بازتوانی عصبی مبتنی بر شواهد، ترکیبی از تمرینات انگیزشی و هدفمند، مداخلات فیزیکی و سطحی و ابزارهای فناوری محور را شامل می‌شود؛ برنامه‌هایی مانند درمان حرکتی القا شده با محدودیت (CIMT) و تمرینات تکراری سازمان یافته نشان داده‌اند که با تحریک پلاستیسیته (تغییر قدرت سیناپسی و بازسازی شبکه) عملکردی قشر حرکتی می‌توان بهبودی معنادار در کارکرد اندام‌های آسیب دیده پس از سکته ایجاد کرد. مؤلفه کلیدی این روش‌ها، بر وظایف واقعی و هدفمند تمرکز دارند، نه حرکات غیرمعنادار یا عمومی، که با مکانیسم‌های سلولی-مولکولی پلاستیسیته همخوانی دارد.

تحریک‌های غیرتهاجمی، از جمله تحریک جریان مستقیم و جریان سینوسی ترانس کرانیال (TACS) و تحریک مغناطیسی مکرر ترانس کرانیال (RTMS)، به عنوان روش‌های مکمل برای تعدیل فعالیت نورونی و بازتعادل عملکرد بین دو نیم کره مغز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شواهد حاصل از مطالعات کنترل شده نشان می‌دهد که این روش‌ها می‌توانند بهبودی‌های رفتاری را تقویت کنند، به ویژه وقتی که هم‌زمان با دوره‌های حساس پلاستیسیته که مغز بیشترین قابلیت تغییر و بهبود و مداخلات توان بخشی را دارد با برنامه درمانی فیزیوتراپی ترکیب شوند. با این حال پاسخ فردی به پارامترهای تحریک مانند شدت، فرکانس و محل تحریک بسیار متغیر است و برای هر بیمار تنظیم پارامترها و زمان بندی مناسب باید بر پایه شواهد تجربی و سنجش‌های عصبی انجام گیرد.



در دهه اخیر تلفیق فناوری‌های BCI، رباتیک و پروتزها باعث شده است بتوان بازخورد حسی از جمله بازخورد لمسی مصنوعی یا بازخورد موقعیتی (بازخورد لمسی مصنوعی حس لمس یا فشار را از طریق محرک‌های الکتریکی یا مکانیکی شبیه سازی می‌کند، در حالی که بازخورد موقعیتی اطلاعات مربوط به موقعیت و حرکت مفاصل و عضلات را منتقل می‌کند تا کنترل دقیق اندام یا پروتز ممکن شود) را به بیمار بازگرداند و بدین ترتیب یادگیری حرکتی، فرآیندی است که طی آن فرد با تمرین و تجربه، مهارت‌ها و حرکات جدید را فرا می‌گیرد و عملکرد حرکتی خود را بهبود می‌بخشد، را تسریع کند؛ این حلقه‌های بازخورد عصبی-مکانیکی پتانسیل کاهش مدت زمان توان بخشی و افزایش انتقال مهارت‌ها به فعالیت‌های روزمره را دارند.




چالش‌های پیاده‌سازی شامل تطبیق شخصی الگوریتم‌ها که فرایندی است که طی آن یک الگوریتم بر اساس ویژگی‌ها و داده‌های هر فرد شخصی‌سازی می‌شود تا عملکرد بهینه و دقیق تری برای کاربران مختلف ارائه دهد، هزینه و دسترسی به تجهیزات، و اعتبارسنجی عملکردی در محیط‌های واقعی زندگی می‌باشد.

چشم اندازهای آینده نگرانه پزشکی معاصر

جنبه‌های اخلاقی، قانونی و ایمنی در کنار پیشرفت‌های علمی تعیین‌کننده خواهند بود: نگرانی‌هایی درباره آگاهی یا حالت‌های شبه‌هوشیاری در مدل‌های ارگانوئیدی، مالکیت و محرمانگی سیگنال‌های عصبی، و پیامدهای هویت-محور تغییرات عملکردی باید توسط چارچوب‌های تنظیمی بین‌المللی و دیالوگ جامعه محور پاسخ داده شوند. در مجموع، نسل نوین نوروساینس نوید تغییرات بنیادین در توانبخشی و درمان را می‌دهد، ولی تحقق کامل این چشم‌انداز مستلزم ترکیب تحقیقات، آزمون‌های بالینی دقیق و سیاست‌گذاری مسئولانه است.

آینده پزشکی عصبی با یکپارچه‌سازی ژن درمانی، ارگانوئیدهای مغزی برای مدل‌سازی بیماری و داروسازی شخصی، و سیستم‌های دست‌کاری عصبی دقیق شکل خواهد گرفت؛ ارگانوئیدها به عنوان مدل‌های سه بعدی مبتنی بر سلول‌های بنیادی، امکان آزمودن پیامدهای ژنتیکی و پاسخ فارماکولوژیک با شباهت بالاتر به انسان را فراهم می‌کنند و به سرعت به ابزارهای پیش‌بالینی مهم تبدیل شده‌اند. در کنار این، پیشرفت‌ها در وکتورهای AAV (ویروس‌های کوچک و غیرپاتوژن هستند که به طور گسترده به عنوان ناقل‌های ژنی در درمان‌های ژنی و تحقیقات نوروساینس استفاده می‌شوند) و فناوری‌های ویرایش ژن‌ها نوید رویکردهای درمانی هدفمند برای بیماری‌های ژنتیکی نورولوژیک را می‌دهند.


از منظر فنی و خدمات بالینی، انتظار می‌رود که «درمان‌های عصبی شخصی‌سازی شده» با استفاده از داده‌های عصبی در مقیاس بزرگ (شبکه‌های EEG و BCI جمع‌آوری شده در محیط‌های روزمره)، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و بیومارکرها، مولکولی، تشخیص و درمان را به صورت پیش‌بینانه‌تر و تطبیقی‌تر انجام دهد. این تحول مزایایی چون شناسایی زودهنگام تشنج، تنظیم خودکار پارامترهای تحریک برای اختلالات مزمن و ارائه درمان‌های ترکیبی دقیق را به همراه دارد، اما هم‌زمان مسائلی درباره حفاظت از داده‌های نرونی، استانداردسازی و عدالت دسترسی پدید می‌آورد.





REFERENCES

- [1]. HARTUNG T, MORALES PANTOJA IE, SMIRNOVA L. BRAIN ORGANOIDS AND ORGANOID INTELLIGENCE FROM ETHICAL, LEGAL, AND SOCIAL POINTS OF VIEW. FRONT ARTIF INTELL. 2024 JAN 5;6:1307613.
- [2]. ZHANG H, JIAO L, YANG S, LI H, JIANG X, FENG J, ZOU S, XU O, GU J, WANG X, WEI B. BRAIN-COMPUTER INTERFACES: THE INNOVATIVE KEY TO UNLOCKING NEUROLOGICAL CONDITIONS. INT J SURG. 2024 SEP 1;110(9):5745-5762.
- [3]. HOFMEIJER, J., HAM, F., & KWAKKEL, G. (2023). EVIDENCE OF RTMS FOR MOTOR OR COGNITIVE STROKE RECOVERY: HYPE OR HOPE?. STROKE, 54(10), 2500-2511. A.123.043159
- [4]. GUNDUZ, M. E., BUCAK, B., & KESER, Z. (2023). ADVANCES IN STROKE NEUROREHABILITATION. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 12(21), 6734.
- [5]. WILLSEY, M. S., SHAH, N. P., AVANSINO, D. T., HAHN, N. V., JAMIOLKOWSKI, R. M., KAMDAR, F. B., ... & HENDERSON, J. M. (2025). A HIGH-PERFORMANCE BRAIN-COMPUTER INTERFACE FOR FINGER DECODING AND OUADCOPTER GAME CONTROL IN AN INDIVIDUAL WITH PARALYSIS. NATURE MEDICINE, 31(1), 96-104.



فاطمه حق بین- کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی

داروهای روان گردان ترکیبات شیمیایی هستند که بر سیستم عصبی اثر می گذارند که به دلیل اثرگذاری بر آگاهی و روان انسان در دسته ی توهم زا جای می گیرند. این ترکیبات با اثر بر گیرنده نوروترنسمیترهایی نظیر سروتونین و دوپامین باعث تغییر در شناخت و ادراک فرد می شود. روان گردان ها به صورت قارچ ها و گیاهان از هزاران سال پیش تاکنون در آئین های درمانی مصرف می شوند.

در قرن بیستم، شیمی دان سوئیسی آلبرت هوفمان در جریان پژوهش های خود بر روی مشتقات ارگوت به منظور بررسی اثرات آن ها بر سیستم گردش خون، برای نخستین بار ترکیب ال اس دی (LSD) را سنتز کرد. بعدها کشف اثرات روان گردان این ماده نقطه ی عطفی در ورود داروهای روان گردان به عرصه ی روان پزشکی به شمار می رود. مطالعات فراوانی برای بررسی اثر روان گردان ها در درمان اعتیاد، اضطراب و افسردگی انجام شده است. اما در نهایت به علت استفاده ی خارج از کنترل و نگرانی های سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشور ها ممنوع شدند.



تحقیقات نوین و کاربردهای درمانی

از دیگر کاربردهای درمانی آنها می توان به درمان اختلال پس از سانحه، درمان افسردگی مقاوم به درمان، اعتیاد و اضطراب وجودی و ترس از مرگ در بیماران لاعلاج اشاره کرد.

در دهه ۱۹۵۰ پژوهش های زیادی بر روی داروی سیلوسایبین برای درمان اعتیاد، افسردگی و اضطراب انجام شد. در نهایت در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده امریکا سیلوسایبین را به عنوان داروی نوید بخش برای افسردگی مقاوم به درمان در نظر گرفته شد. در چند ایالت مصرف درمانی و نظارت شده ی سیلوسایبین قانونی شد و در اروپا نیز پژوهش ها درباره ی سیلوسایبین باعث شد درمان های تحت نظارت با روان گردان ها بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. تحقیقات انجام گرفته نشان داد در افراد مبتلا به بیماری های تهدید کننده زندگی مثل سرطان داروهای روان گردان کلاسیک ممکن است منجر به کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی شود.






هدف اصلی این داروها تنظیم مجدد شیمی مغز با اثر گذاری بر انتقال دهنده های عصبی و گیرنده های آنها در مغز می باشد. مکانیسم های عملکرد این داروها شامل افزایش و کاهش سطح بیانگیرنده های عصبی و تغییر در حساسیت آنها است.

امروزه روانگردان ها همچنان در بیشتر کشورها ممنوع هستند. اما موج جهانی برای بازنگری در قوانین استفاده پزشکی و درمانی ان ها در حال شکل گیری است. اکنون جنبش های علمی و اجتماعی معتقدند که اگر روانگردان ها در محیط کنترل شده اتاق درمان استفاده شوند، می توانند انقلابی در روانپزشکی و سلامت روان ایجاد کنند.


چالش ها و چشم اندازها

استفاده از داروهای روان گردان مانند هر روش درمانی دیگری دارای چالش هایی مانند عدم اطمینان از تأثیر مثبت یکسان بر همه بیماران و خطر بروز پنیک، اختلالات شدید و استفاده پرخطر در بیماران با پیشینه اسکیزوفرنی است. گسترش بازار و اقتصادی شدن درمان ها، همراه با تغییرات قانونی و سیاست گذاری، دسترسی گسترده تر با تمرکز بر عدالت سلامت و نوآوری در روش های درمانی و ترکیب فرمولاسیون ها، از اولویت های کلیدی حوزه سلامت در این زمینه به شمار می روند.



درک عملکرد مغز انسان، یکی از بزرگ ترین چالش های علمی قرن بیست و یکم است. این اندام پیچیده با میلیاردها نورون و تریلیون ها ارتباط سیناپسی، رفتاری از خود نشان می دهد که هنوز در بسیاری از جنبه ها ناشناخته باقی مانده است. در دهه های اخیر، ترکیب دانش زیست شناسی، ریاضیات و علوم کامپیوتر، رویکردی نوین به نام "مدل سازی محاسباتی مغز" را شکل داده است. هدف این شاخه شبیه سازی رفتار نورون ها و شبکه های عصبی بیولوژیکی با استفاده از مدل های ریاضی و الگوریتم های کامپیوتری است، تا از طریق آن بتوان سازوکارهای پیچیده مغز را بهتر شناخت. مدل سازی محاسباتی نه تنها پلی میان زیست شناسی و فناوری اطلاعات است بلکه بستر تازه ای برای کشف اصول بنیادی هوش، یادگیری و شناخت در موجودات زنده فراهم می سازد.

مدل سازی بیولوژیکی در علوم اعصاب بر پایه ی ایده های ساده اما عمیق استوار است: "هر پدیده زیستی را می توان با معادلات و روابط ریاضی توصیف کرد." در این رویکرد، نورون ها به عنوان واحدهای پردازش اطلاعات در مغز، با مدل های فیزیولوژیکی و الکتریکی بازنمایی می شوند تا رفتار واقعی آن ها در محیطی شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گیرد. از نخستین مدل های کلاسیک مانند مدل هاکین و هاکسلی که در دهه ۱۹۵۰ توصیف گردید و نحوه تولید و انتشار پتانسیل عمل در نورون ها را با دقتی چشمگیر توصیف کرد، تا مدل های ساده تر نظیر مدل انباشت و شلیک نشستی دار و مدل ایژیکویچ مسیر مدل سازی عصبی همواره میان دقت زیستی و سادگی محاسباتی درنوسان بوده است.



مدل هاکین و هاکسلی دقیق ترین مدل زیستی است که بر پایه جریان های یونی واقعی سدیم و پتاسیم و تغییرات غشایی توصیف می شود، اما محاسبات سنگینی دارد. در مقابل، مدل انباشت و شلیک نشستی دار با فرض غشاء به صورت یک خازن ساده، تنها زمان وقوع اسپایک را پیش بینی می کند و دقت فیزیولوژیک کمتری دارد. مدل ایژیکویچ ترکیبی از دقت زیستی و کارایی محاسباتی است و می تواند الگوهای مختلف اسپایکینگ نورونی را با معادلات ساده تر بازتولید کند.



در این میان، پتانسیل عمل به رویداد واقعی و گذرای تغییر ولتاژ غشاء در اثر باز و بسته شدن کانال‌های یونی گفته می‌شود، در حالی که اسپایک بازنمایی ریاضی یا محاسباتی همین رویداد در مدل‌های نرونی است.

در این میان، پژوهشگران بسته به هدف مطالعه، سطح مدل‌سازی را تعیین می‌کنند، از شبیه‌سازی رفتار تک‌نورون و کانال‌های یونی گرفته تا ساخت مدل‌هایی که شبکه‌های عصبی بیولوژیکی را با هزاران نورون و میلیون‌ها سیناپس در محیط‌های محاسباتی بازآفرینی می‌کنند. این شبیه‌سازی‌ها، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های دقیق عددی، تصویری از چگونگی هماهنگی نورون‌ها و شکل‌گیری فعالیت‌های پیچیده مغزی ارائه می‌دهند. مدل‌های بیولوژیکی در عین سادگی، دریچه‌ای دقیق به سوی شناخت قوانین بنیادین فعالیت مغز و شبکه‌های آن می‌گشایند.

برای تحقق مدلسازی مغز، صرفاً داشتن دانش زیستی کافی نیست؛ بخش عمده‌ای از این فرایند به قدرت محاسباتی و الگوریتم‌های عددی وابسته است. مدل‌های نرونی و شبکه‌های بیولوژیکی اغلب شامل معادلات دیفرانسیل غیرخطی هستند که رفتار الکتریکی سلول‌ها و تعاملات سیناپسی را در طول زمان توصیف می‌کنند. حل این معادلات به کمک روش‌های عددی مانند اویلر یا رانگ-کوتا انجام می‌شود. با رشد توان پردازشی رایانه‌ها، امکان شبیه‌سازی هم‌زمان هزاران نورون در قالب شبکه‌های گسترده فراهم شده است.

در سال‌های اخیر، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق نیز به یاری علوم اعصاب آمده‌اند.

این الگوریتم‌ها قادرند ساختار و پویایی شبکه‌های عصبی بیولوژیکی را تحلیل کرده و پارامترهای بهینه برای بازسازی دقیق‌تر عملکرد مغز را بیابند. شبکه‌های عصبی مصنوعی در این میان نه تنها ابزار تحلیل داده‌اند، بلکه خود نیز الهام‌گرفته از شبکه‌های بیولوژیکی هستند.

نرم‌افزارهایی همچون NEURON برای مدل‌سازی دقیق تک‌نورون‌ها، NEST برای شبیه‌سازی شبکه‌های بزرگ اسپایکینگ و BRIAN² برای توسعه سریع مدل‌های پژوهشی ابزارهای کلیدی این حوزه محسوب می‌شوند. همچنین، چارچوب‌هایی مانند THE VIRTUAL BRAIN امکان شبیه‌سازی تعامل نواحی مختلف مغزی را در مقیاس کلان فراهم کرده‌اند. بدین ترتیب، ترکیب مدل‌های ریاضی، روش‌های عددی و الگوریتم‌های یادگیری بنیان فنی شبیه‌سازی شبکه‌های بیولوژیکی و مدلسازی محاسباتی مغز را شکل می‌دهد.

مدل‌سازی محاسباتی مغز فراتر از یک ابزار تحقیقاتی است؛ این حوزه اکنون در قلب پژوهش‌های نوین علوم اعصاب، پزشکی و هوش مصنوعی جای گرفته است. در علوم اعصاب، مدل‌ها به دانشمندان کمک می‌کنند تا فعالیت شبکه‌های عصبی را در شرایط طبیعی و بیماری‌زا بررسی کرده و مکانیزم‌هایی چون یادگیری، حافظه و پلاستیسیته سیناپسی را بهتر درک کنند. در پزشکی، مدل‌های محاسباتی برای شبیه‌سازی اختلالاتی مانند صرع، آلزایمر و پارکینسون به کار می‌روند و در طراحی رابط‌های مغز-رایانه (BCI)، ایمپلنت‌های عصبی و درمان‌های هدفمند دارویی نقشی تعیین‌کننده دارند.




افق سوم، هوش مصنوعی است؛ جایی که الهام از مغز زیستی به تولد نسل جدیدی از الگوریتم‌ها منجر شده است. شبکه‌های عصبی اسپایکینگ، نوعی مدل محاسباتی از مغز که بر پایه ارسال پالس‌های زمانی (اسپایک) بین نورون‌ها عمل می‌کنند و واقعی‌تر از شبکه‌های عصبی مصنوعی کلاسیک رفتار عصبی را شبیه‌سازی می‌کنند، نمونه‌ای از تلاش برای تقلید نحوه‌ی واقعی انتقال اطلاعات در مغز هستند. در آینده ترکیب داده‌های تجربی مغز با مدل‌های یادگیری عمیق می‌تواند به فهم بهتر فرایندهای شناختی و توسعه‌ی سامانه‌های هوشمندی بینجامد که نه تنها می‌آموزند، بلکه می‌فهمند. چشم‌انداز این حوزه، ایجاد پلی استوار میان زیست‌شناسی و فناوری است؛ پلی که در آن، مغز انسان هم الهام‌بخش و هم موضوع مطالعه است.

مدلسازی محاسباتی مغز تلاشی برای ترجمه‌ی پیچیدگی زیستی به زبان منطق و عدد است. این حوزه نشان می‌دهد که برای فهم پدیده‌هایی همچون آگاهی، ادراک و یادگیری باید مرز میان زیست‌شناسی و فناوری را درنوردید. شبیه‌سازی شبکه‌های عصبی بیولوژیکی با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری، دریچه‌ای نوبه‌شناخت کارکرد مغز گشوده است؛ دریچه‌ای که از دل آن می‌توان هم عملکرد طبیعی مغز و هم منشأ بسیاری از اختلالات عصبی را بهتر درک کرد. آینده‌ی این حوزه، نه تنها در خدمت علوم اعصاب و پزشکی، بلکه در توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند الهام‌گرفته از مغز نیز نقش‌آفرین خواهد بود. آنچه این چشم‌انداز را ممکن می‌سازد، تداوم همکاری میان زیست‌شناسان، ریاضی‌دانان و مهندسان است؛ هم‌افزایی‌ای که نویدبخش نسلی تازه از فناوری‌ها و دانشی ژرف‌تر از ماهیت هوش انسانی خواهد بود.


REFERENCES

- MARKRAM, H. (2006). THE BLUE BRAIN PROJECT. NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE, 7(2), 153-160.
- IZHIKEVICH, E. M. (2003). SIMPLE MODEL OF SPIKING NEURONS. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, 14(6), 1569-1572.
- GEWALTIG, M.-O., & DIESMANN, M. (2007). NEST (NEURAL SIMULATION TOOL). SCHOLARPEDIA, 2(4), 1430.
- EINEVOLL, G. T., DESTEXHE, A., DIESMANN, M., GRÜN, S., JIRSA, V., DE KAMPS, M., ... & PLESSER, H. E. (2019). THE SCIENTIFIC CASE FOR BRAIN SIMULATIONS. NEURON, 102(4), 735-744.
- ABBOTT, L. F., & DAYAN, P. (1999). THEORETICAL NEUROSCIENCE: COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL MODELING OF NEURAL SYSTEMS. MIT PRESS. (NO DOI AVAILABLE; BOOK REFERENCE.)
- DECO, G., JIRSA, V. K., & MCINTOSH, A. R. (2011). EMERGING CONCEPTS FOR THE DYNAMICAL ORGANIZATION OF RESTING-STATE ACTIVITY IN THE BRAIN. NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE, 12(1), 43-56.
- STIMBERG, M., BRETTE, R., & GOODMAN, D. F. M. (2019). BRIAN 2, AN INTUITIVE AND EFFICIENT NEURAL SIMULATOR. ELIFE, 8, E47314.



نوروساینس بالینی

مغز نه تنها مرکز اندیشه، بلکه کانون سلامت بدن است. در این بخش به پیوند میان علم اعصاب و پزشکی بالینی می‌پردازیم - از نقش میکروبیوم روده در سلامت روان تا تأثیر آلودگی هوا و نورهای مصنوعی بر عملکرد مغز. هدف این بخش، نزدیک کردن پژوهش‌های عصبی به زندگی روزمره و فهم بهتر بیماری‌ها و رفتارهای انسانی است.





ارتباط روده - مغز :



در انسان، میکروبیوتای روده با سکونت در دستگاه گوارش نقش مهمی در متابولیسم مواد مغذی و داروها، تعدیل سیستم ایمنی و دفاع در برابر عوامل بیماری‌زا ایفا می‌کند. ارتباط میان دستگاه عصبی مرکزی، روده و میکروبیوتا از طریق "محور روده-مغز" صورت می‌گیرد. درک نقش میکروبیوتای روده در محور روده-مغز برای فرایند تکامل عصبی، یک رویکرد روبه رشد است تا تأثیر آن بر بیماری‌زایی و نتایج درمانی ارزیابی شود. روده از طریق دو مسیر نوروآناتومیک (تشریحی-عصبی) با مغز ارتباط برقرار می‌کند. مسیر اول سیستم عصبی خودمختار شامل عصب واگ است که مغز و روده را به صورت دوطرفه به هم متصل می‌کند و اطلاعات حسی و حرکتی بین این دو ارگان را منتقل می‌کند. مسیر دوم سیستم عصبی روده‌ای واقع در دیواره دستگاه گوارش، مسیر ارتباط مستقلی ایجاد می‌کند که امکان ارتباط دوطرفه بین روده و مغز را فراهم می‌کند، حتی بدون دخالت مستقیم مغز.

ریحانه مومنی فرد کارشناسی میکروبیولوژی

بدن انسان میزبان چندین تریلیون میکروارگانیسم (از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها، آرکی‌ها و قارچ‌ها) است که متعلق به صدها گونه مختلف هستند و بخش اعظم آن‌ها در روده ساکن‌اند در دهه‌های اخیر، دانش ما به طور چشمگیری درباره تأثیر میکروبیوتای روده بر جنبه‌های مختلف سلامت انسان، از جمله سلامت مغز، افزایش یافته است. تأثیر میکروبیوتای روده محدود به اختلالات التهابی عصبی و روانی نیست و در رشد و تکامل مغز نیز نقش مهمی دارد.


سیستم عصبی خودمختار سه جزء دارد:

سیستم عصبی سمپاتیک، سیستم عصبی پاراسمپاتیک و سیستم عصبی روده‌ای یا انتریک.




Healthy Gut-Brain Axis

Synapse Formation
Calcium signaling
Microglia Differentiation
Cognition
Learning
Memory
Mood
Locomotion
Eating behavior




Inflammasome

Pore formation — Pyroptosis
Nucleosome
Cytokines
IL-18
IL-1β
pro-IL-18
pro-IL-1β
CYTOPLASM
EXTRACELLULAR SPACE




مطالعات متعدد حاکی از آن است که میکروب‌ها می‌توانند مولکول‌های نورواکتیوی تولید کنند که مستقیماً در ارتباط بین روده و مغز نقش دارند. انتقال دهنده‌های عصبی مانند استیل کولین، گابا و سروتونین که توسط باکتری‌های متعلق به گونه‌های لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم، انتروکوکوس و استرپتوکوکوس تولید می‌شوند، می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فیزیولوژی سلول‌های مغز تأثیر بگذارند. نکته قابل توجه این است که حدود ۹۰٪ از نوروترنسمیتر سروتونین که بر اعمال متعددی از جمله خلق و خو، رفتار، خواب موثر است در دستگاه گوارش تولید می‌شود.



تأثیر میکروبیوم در بیماری عصبی:

در محور روده - مغز میکروبیوتا و متابولیت‌های تولید شده توسط آن‌ها، از جمله اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، انتقال دهنده‌های عصبی و سایر مواد، به طور فعال بسیاری از مسیرهای ایمنی را تعدیل می‌کنند؛ این تعدیل‌ها به نوبه خود بر عملکردهای شناختی و رفتاری مانند حافظه، یادگیری، حرکت و بروز اختلالات عصبی تخریبی تأثیر می‌گذارند. در همین راستا، تحقیقات نشان داده‌اند که اینفلامازوم (یک ساختار پروتئینی درون سلولی است که نقش مهمی در پاسخ ایمنی و التهاب دارد) در رفتارهای شبیه به افسردگی و اضطراب نقش دارد و احتمالاً اختلال میکروبی عامل این نقایص خلقی و رفتاری است، هرچند مکانیسم دقیق این پدیده هنوز به طور کامل کشف نشده است.



مشخص شده که افراد مبتلا به افسردگی مزمن، سطح بالایی از ایمونوگلوبولین های IGA و IGM علیه لیپوپلی ساکارید (LPS) مشتق شده از انتروباکتریاسه را در پلاسمای خود نشان می دهند. این نشان می دهد که میکروبیوتا می تواند با ایجاد التهاب مزمن احتمالی، در بروز افسردگی نقش داشته باشد. همچنین ارتباط واضحی بین التهاب سیستم گوارش و بروز اضطراب وجود دارد. تولید چندین نوروترنسمیتر که توسط میکروبیوم کنترل می شود، دوپامین، گابا و سروتونین، می توانند بر عملکرد مغز تأثیر بگذارند و ترکیب و عملکرد میکروبیوتای روده را تعدیل کنند، که نشان دهنده ارتباط متقابل پیچیده ای دو طرفه بین روده و مغز است. علاوه بر این، دیس بیوز (اختلال در تعادل طبیعی میکروبیوتای بدن) روده ناشی از عفونت باکتریایی می تواند با تأثیر بر مسیرهای ایمنی و متابولیسمی در محور روده-مغز، اضطراب را تشدید کند.



درمان‌های مبتنی بر تعدیل میکروبیوم

اعتقاد بر این است که استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها منجر به عوارضی مانند ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در برابر پاتوژن‌ها و عدم پاسخ‌دهی آن‌ها به دارو شده است. میکروبیال‌تراپی (درمان مبتنی بر میکروب) بر این اشکالات داروهای نوین غلبه می‌کند. استفاده از پروبیوتیک‌ها که از انواع میکروارگانیسم‌های طبیعی بدن هستند می‌توانند سلامت بدن را بهبود دهند و معمولاً با عوارض جانبی کمی همراه اند. علاوه بر این، پروبیوتیک‌ها می‌توانند از نظر ژنتیکی مهندسی شوند تا اثربخشی و ایمنی آن‌ها بهبود یابد. این میکروب‌ها این پتانسیل را دارند که از طریق تعامل با میزبان، بر شروع بیماری‌ها غلبه کنند و بنابراین برای توسعه میکروبیال‌تراپی، این روش درمانی افق امیدبخشی برای مقابله با بیماری‌های جدی فراهم می‌کند و می‌تواند به عنوان منبع بالقوه برای توسعه درمان‌های شخصی‌سازی شده مورد استفاده قرار گیرد، چرا که می‌تواند بر مسائل کلیدی مانند تنوع فردی و پایداری در انواع محیط‌ها غلبه کند. از آنجا که دیس‌بیوزیس با بسیاری از بیماری‌های انسانی از جمله اختلالات گوارشی، متابولیک، نورودژنراتیو و سیستم ایمنی مرتبط است، اکنون راهبردهای مختلفی برای بازگرداندن میکروبیوتای طبیعی بدن به منظور مدیریت مؤثر بیماری به کار گرفته می‌شوند.

در حال حاضر، علاقه فزاینده‌ای به توسعه و ارائه کنسرسیون‌های میکروبی سنتتیک (گروه‌های طراحی شده و کنترل شده از میکروب‌ها که با هدف خاصی مانند تولید دارو، مهندسی متابولیک یا بهبود سلامت میزبان کنار هم قرار گرفته‌اند) برای مزایای سلامتی وجود دارد.

REFERENCES





بررسی تاثیر آلودگی هوا

و عوامل زیست محیطی بر سلامت مغز

و افزایش خطر بیماری های عصبی

آلودگی هوا یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای زیست محیطی در قرن بیست و یکم است که تأثیرات قابل توجهی بر سلامت عمومی جانوران دارد و در سال های اخیر، شواهد رو به افزایشی نشان داده اند که آلودگی هوا نه تنها بر سیستم تنفسی و قلبی-عروقی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند عامل مهمی در بروز بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و انواعی از دمانس باشد، جایی که آلاینده‌هایی مانند ذرات معلق ریز ($PM_{2.5}$)، دی اکسید نیتروژن (NO_2)، اوزون (O_3) و دی اکسید گوگرد (SO_2) نقش کلیدی ایفا می‌کنند و مطالعات نشان می‌دهند که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این آلاینده‌ها می‌تواند التهاب سیستماتیک و استرس اکسیداتیو را در مغز ایجاد کند که منجر به کاهش عملکرد شناختی و افزایش خطر ابتلا به دمانس می‌شود.

نتایج مطالعاتی که در دانشگاه‌های جان هاپکینز، اموری و رود آیلند انجام شده حاکی از آنست که ذرات معلق ریز ($PM_{2.5}$) می‌توانند باعث تجمع پروتئین آلفا-سینوکلئین در مغز موش‌ها شوند که مشابه ویژگی‌های دمانس لوئی بادی (یک نوع اختلال نورودژنراتیو که باعث تغییرات همزمان شناختی و حرکتی می‌شود) است و این یافته‌ها نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و تغییرات پاتولوژیک در مغز هستند که می‌تواند به اختلالات نورودژنراتیو منجر شود.

علاوه بر این، نگرانی‌های بسیاری در مورد تأثیر میکروپلاستیک‌ها (MPS) و نانوپلاستیک‌ها (NPS) بر سلامت مغز انسان وجود دارد. مطالعات متعددی نشان می‌دهند که این ذرات می‌توانند از سد خونی-مغزی عبور کرده، در بافت مغز تجمع یابند و باعث التهاب مزمن مغز شوند، که این فرآیند می‌تواند به آسیب های سلولی و اختلالات شناختی بیانجامد. تماس با MPS/NPS می‌تواند باعث فعال سازی میکروگلیا و افزایش ترشح سیتوکین های التهابی شود که به آسیب نورون‌ها منجر می‌شود، همچنین این ذرات می‌توانند تولید رادیکال‌های آزاد را در مغز افزایش دهند که به آسیب غشاهای سلولی و پروتئین‌ها می‌انجامد و در نهایت به بروز اختلالات نورولوژیکی مانند کاهش حافظه و مشکلات رفتاری کمک کند. مطالعات نشان داده‌اند که MPS/NPS می‌توانند بر مسیر های انتقال عصبی مانند سروتونرژیک، گلوتامرژیک (گلوتاماترژیک)، دوپامینرژیک و گاباارژیک تأثیر بگذارند و پیشرفت بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر، پارکینسون و دمانس را افزایش دهند، جایی که این تغییرات می‌تواند به عدم تعادل در سطوح نوروترانسمیترها منجر شود و علائم نورودژنراتیو را تشدید کند.

در مجموع، این عوامل زیست محیطی نه تنها تهدیدی برای سلامت جسمی هستند، بلکه می‌توانند روند پیری مغز را تسریع کنند و نیاز به اقدامات پیشگیرانه مانند کاهش آلودگی و محدود کردن پلاستیک‌ها را برجسته می‌سازند.



آلودگی هوا و آسیب عصبی

آلاینده‌هایی مانند دی‌اکسید نیتروژن و اوزون موجب استرس اکسیداتیو و آسیب سلولی می‌شوند که می‌تواند به تخریب نورون‌ها و کاهش عملکرد شناختی بینجامد.

مطالعات انجام‌شده در دانشگاه‌های جان هاپکینز، اموری و رود آیلند نشان می‌دهند که قرار گرفتن در معرض ذرات معلق ریز ($PM_{2.5}$) می‌تواند باعث تجمع پروتئین‌های غیرطبیعی مانند آلفا-سینوکلئین و بتا-آمیلوئید در مغز شود، که مشابه ویژگی‌های دمانس لوئی‌بادی و بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون است. این یافته‌ها نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین آلودگی هوا و تغییرات پاتولوژیک مغز هستند که می‌تواند به اختلالات نورودژنراتیو منجر شود.



تحقیقات اخیر همچنین حاکی از آن است که حتی سطوح پایین آلودگی هوا می‌تواند رشد و نمو مغز در نوجوانان را تغییر دهد و ریسک بستری شدن به دلیل اختلالات نورولوژیکی را افزایش دهد. علاوه بر این، قرار گرفتن در معرض آلاینده‌هایی مانند نیترات‌ها با افزایش بروز سکته مغزی، سردردهای مزمن و تشدید علائم دمانس مرتبط است، که این اثرات اغلب از طریق اختلالات متابولیک و التهاب مزمن مغز ایجاد می‌شوند.

مکانیزم‌های زیان آور محیطی

طبق جدیدترین تحقیقات آلودگی محیط زیست خطر ریسک مبتلا شدن به زوال عقل، تغییرات اپی‌ژنتیکی و اختلالات رفتاری و روان شناختی را افزایش می‌دهد. همچنین بر رشد مغز کودکان تأثیری گذارد. در مطالعه‌ای که در کشور انگلستان انجام گرفت نشان داده شد که افراد سالمندی که برای مدت طولانی در معرض $PM_{2.5}$ و NO_2 بوده‌اند عملکرد زبانی کمتری داشته‌اند. عملکرد زبانی به توانایی فرد در درک و تولید گفتار و نوشتار اشاره دارد و شامل مهارت‌هایی مانند فهمیدن واژه‌ها و جملات، استفاده صحیح از گرامر و لغات، و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران است.

مطالعه‌ای که در موسسه سلامت جهانی بارسلونا "ISGLOBAL" انجام گرفت نشان داد که تماس با آلودگی هوا در کودکی با کاهش اتصال عملکردی بین مناطق مهم مغزی همراه است، ارتباطی که در نوجوانی هم دیده می‌شود که می‌تواند عملکرد شناختی را پایین بیاورد و بر IO کودکان تأثیر بگذارد همچنین آلودگی هوا باعث تغییر در بیان ژن‌ها و عملکرد فاکتورهای اپی ژنتیک می‌شود که می‌تواند رشد و سلامت عصبی را تحت تأثیر قرار دهد.



راهکارهای کاهش خطرات

برای کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا،
اقدامات مؤثری در سطح فردی و در سطح جامعه
پیشنهاد شده که عبارتند از:

ناشی از آلودگی هوا

اقدامات فردی

استفاده از دستگاه تصفیه هوا با فیلتر که ذرات معلق ریز ($PM_{2.5}$) را تا بیش از ۸۰٪ کاهش دهند
استفاده از ماسک مناسب، کاهش فعالیت در فضای باز در ساعات اوج آلودگی و انتخاب مسیرهای کم‌ترافیک
کاهش آلودگی درخانه با استفاده کمتر از اجاق‌های گازی، سوخت‌های فسیلی یا وسایل گرمایشی قدیمی


اقدامات اجتماعی

کاهش منابع اصلی آلودگی در سطح شهری و افزایش فضای سبز شهر
افزایش آگاهی عمومی با آموزش شهروندان درباره اثرات آلودگی هوا بر سلامت و راه‌های پیشگیری و نظارت
دقیق و اجرای استانداردهای سختگیرانه



REFERENCES

- . **IMPACT OF AIR POLLUTION ON NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC HEALTH** - بررسی تأثیر آلودگی هوا بر سلامت عصبی و روانی، با - تمرکز بر التهاب عصبی و استرس اکسیداتیو.
- . **THE EFFECTS OF AIR POLLUTION ON NEUROLOGICAL DISEASES** - مطالعه‌ای در مورد اثرات آلودگی هوا بر بیماری‌های عصبی، شامل - کاهش عملکرد شناختی.
- . **AIR POLLUTION AND PARKINSON'S DISEASE - EVIDENCE AND FUTURE DIRECTIONS** - شواهد اپیدمیولوژیک در مورد ارتباط آلودگی هوا با - پارکینسون و جهت‌گیری‌های آینده.
- . **MICRO- AND NANOPLASTICS BREACH THE BLOOD-BRAIN BARRIER (BBB)** - بررسی نفوذ میکروپلاستیک‌ها و نانوپلاستیک‌ها به سد - خونی-مغزی و اثرات بر سلامت مغز.
- . **POLYSTYRENE NANOPLASTICS PENETRATE ACROSS THE BLOOD-BRAIN BARRIER AND CAUSE NEURONAL DEATH IN MICE** - مطالعه تجربی در مورد نفوذ نانوپلاستیک‌ها به مغز و ایجاد مرگ نورونی در مدل حیوانی.





به طور معمول، نور در ساعات صبح موجب پیشرفت فاز و نور در ساعات عصر سبب تأخیر آن می‌گردد. حساسیت افراد به نور مصنوعی، به ویژه به نور آبی در عصر، متفاوت است و می‌تواند هم‌زمانی ساعت درونی با چرخه محیطی را دچار اختلال کند.



معصومه جلمبادانی- کارشناسی زیست‌شناسی جانوری

گسترش استفاده از نور مصنوعی (مانند روشنایی معابر، منابع نور داخلی و نمایشگرهای الکترونیکی)، همراه با رشد شهرنشینی از اوایل قرن بیستم تاکنون، منجر به کاهش چشمگیر تاریکی طبیعی شب و در نتیجه ناپدید شدن «شب زیستی» برای بخش بزرگی از جمعیت انسانی شده است. این وضعیت را «آلودگی نوری» می‌نامند که شامل تابش، خیرگی و انتشار نور ناخواسته است. نور مصنوعی شبانه، به ویژه در طیف آبی (طول موج کوتاه)، می‌تواند با ریتم‌های طبیعی بدن تداخل کند.

اثرات نور مصنوعی بر خواب

نور مصنوعی، حتی با شدت متوسط و یا نورآبی در ساعات پیش از خواب، می‌تواند زمان به خواب رفتن را به تأخیر اندازد، مدت زمان خواب را کاهش دهد، کیفیت خواب را پایین آورد و باعث بیداری‌های شبانه شود. حتی نورهای ضعیف شهری (مثلاً روشنایی خیابان یا تابش آسمان شهر) می‌توانند ترشح ملاتونین را سرکوب کنند. نتایج مطالعات حاکی از آن است که آستانه حساسیت نوری در انسان‌ها حدود ۶ لوکس برآورد می‌شود؛ به این معنا که حتی شدت‌های نسبتاً پایین نور می‌توانند پاسخ‌های شبانه‌روزی را فعال کرده و بر فیزیولوژی یا زمان‌بندی خواب اثرگذار باشند.

ریتم‌های شبانه‌روزی و ملاتونین

در مرکز مغز، هسته سوپراکیاسماتیک ساعت مرکزی بیولوژیک را بر اساس اطلاعات نوری دریافتی از چشم تنظیم می‌کند. در تاریکی، غده پینه‌آل (اپی‌فیز یا صنوبری) ملاتونین ترشح می‌کند که به عنوان «هورمون تاریکی» شناخته می‌شود و به بدن سیگنال می‌دهد که زمان خواب نزدیک است. قرار گرفتن در معرض نور در زمان نامناسب (به ویژه در عصر و شب) می‌تواند ترشح ملاتونین را مهار کند یا زمان آغاز ترشح آن را به تأخیر اندازد.

پاسخ ریتم سیرکادین (شبانه‌روزی) بدن به نور بر اساس منحنی پاسخ فازی صورت می‌گیرد؛ این منحنی نشان می‌دهد که زمان‌بندی تابش نور در شبانه‌روز تعیین می‌کند آیا فاز ساعت زیستی پیش رفت می‌کند یا دچار تأخیر می‌شود.



یافته‌ها نشان می‌دهد که پس از دو ساعت مطالعه از طریق نمایشگرهای الکترونیکی، میزان ترشح ملاتونین در شرکت‌کنندگان تا حدود ۵۵٪ کاهش یافته و زمان آغاز ترشح آن به‌طور میانگین حدود ۱٫۵ ساعت به تأخیر افتاده است. تداوم این اختلال در خواب و ناهماهنگی ریتم شبانه‌روزی می‌تواند در درازمدت با بروز مشکلاتی مانند بی‌خوابی مزمن و سایر اختلالات خواب همراه باشد.

راهکارهای کاهش اثرات آلودگی نوری در محیط های مسکونی

۱. تنظیم شرایط نوری خانه و اتاق خواب

- استفاده از منابع نوری با دمای رنگ گرم (طیف زرد یا قرمز ملایم) در ساعات عصر و شب، به‌منظور کاهش مؤلفه‌ی آبی نور که بیشترین اثر را بر مهار ترشح ملاتونین دارد
- کاهش شدت روشنایی محیطی در شب تا حداقل مقدار مورد نیاز برای ایمنی و آسایش بصری
- استفاده از پرده‌های ضخیم یا پوشش‌های نوری مناسب برای جلوگیری از نفوذ نور خیابان به فضای خواب
- حذف یا خاموش کردن منابع نوری غیرضروری (مانند نمایشگرها و چراغ‌های نشانگر دستگاه‌ها) در اتاق خواب، به‌ویژه پیش از زمان خواب

۲. استفاده از فیلترها و فناوری‌های کنترل نور

- به‌کارگیری عینک‌های فیلترکننده نور آبی در ساعات عصر می‌تواند با کاهش تحریک مسیر شبکه‌-سوپراکیسماتیک، از تأخیر در ترشح ملاتونین و اختلال در ریتم شبانه‌روزی پیشگیری کند
- فعال‌سازی حالت شب (NIGHT MODE) یا تنظیم خودکار کاهش شدت و دمای رنگ نمایشگرها در دستگاه‌های الکترونیکی به‌ویژه در ساعات پیش از خواب توصیه می‌شود
- استفاده از لامپ‌هایی با طیف نوری تعدیل‌شده (دارای مؤلفه آبی کمتر) در محیط‌های خانگی شبانه می‌تواند اثرات فیزیولوژیک نور مصنوعی را به حداقل برساند




۳. مدیریت زمان قرارگیری در معرض نور

- پرهیز از مواجهه با نورهای شدید یا نمایشگرهای الکترونیکی در حدود دو تا سه ساعت پیش از خواب، به منظور پیشگیری از مهار ترشح ملاتونین و تأخیر در فاز خواب
- در صورت نیاز به روشنایی شبانه، استفاده از منابع نوری با شدت کم توصیه می‌شود
- قرارگیری در معرض نور طبیعی صبحگاهی (به ویژه نور خورشید) به هم‌زمان‌سازی ساعت زیستی درون‌زاد با چرخه ی ۲۴ ساعته محیط و بهبود کیفیت خواب شبانه کمک می‌کند

۴. طراحی شهری و سیاست‌های کلان برای کاهش آلودگی نوری

- بهینه‌سازی سامانه‌های روشنایی شهری از طریق کاهش منابع نوری غیرضروری و به کارگیری چراغ‌هایی با کنترل دقیق جهت تابش به منظور جلوگیری از پراکنش نور به آسمان یا فضاهای مسکونی
- تدوین و اجرای استانداردهای روشنایی شهری شامل تعیین حداکثر شدت مجاز (لوکس) و محدودسازی تابش رو به بالا، به ویژه در مناطق مسکونی و اطراف زیستگاه‌های طبیعی
- طراحی و برنامه‌ریزی نظام‌مند نور شبانه شهری بر پایه‌ی نیازهای واقعی ایمنی و کارکردی، نه صرفاً ملاحظات زیبایی‌شناختی یا تبلیغاتی
- ارتقای آگاهی عمومی و آموزش شهروندان و مدیران شهری درباره‌ی پیامدهای زیست‌محیطی و سلامت‌محور آلودگی نوری، به منظور ترویج رفتارهای نوری مسئولانه

REFERENCES



تنوع و حفاظت

حیات بر زمین، سمفونی ظریفی از تعادل است. در این بخش، از اثرات تغییرات اقلیمی و آلودگی صوتی بر جانوران و مغز آن‌ها می‌گوییم؛ از نهنگ‌هایی که زیر امواج صوتی سرگردان می‌شوند تا پرندگان که حافظه مهاجرتشان دگرگون می‌شود. این یادآوری است که حفاظت از طبیعت، در حقیقت حفاظت از خود ما و آینده شناختی سیاره است.





بخش اول

منابع آلودگی صوتی در اقیانوس‌ها

اقیانوس‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین اکوسیستم‌های زمین، نقشی کلیدی در حفظ تعادل زیست‌محیطی دارند. بسیاری از موجودات دریایی برای ناوبری، تغذیه، جفت‌یابی و برقراری ارتباطات اجتماعی به صداهای زیرآبی وابسته‌اند. در دهه‌های اخیر، فعالیت‌های طبیعی و به‌ویژه انسانی منجر به افزایش سطح آلودگی صوتی در محیط‌های دریایی شده است؛ پدیده‌ای که اثرات نامطلوبی بر رفتار، تولیدمثل و بقای گونه‌های مختلف دارد. شناخت منابع این آلودگی‌های صوتی و بررسی اثرات آن، نخستین گام در مدیریت و کاهش پیامدهای آن است.



امواج سطحی و باد

برخورد و شکست امواج در سطح آب همراه با وزش باد، صداهایی تولید می‌کند که تا اعماق مختلف آب نفوذ می‌کنند. این صداها طبیعی می‌باشند و با پدیده‌هایی همچون جزر و مد و طوفان‌ها ارتباط مستقیم دارند.

زمین‌لرزه‌ها

زمین‌لرزه‌ها و لغزش‌های زیرآبی از منابع کوتاه مدت و نادر آلودگی صوتی محسوب می‌شوند و امواج صوتی قدرتمندی در آب ایجاد می‌کنند.

منابع طبیعی آلودگی صوتی

حباب‌های گازی

حباب‌های گازی که در سطح آب تشکیل می‌شوند و توسط جریان‌ها به اعماق اقیانوس منتقل می‌شوند، از منابع اصلی تولید آلودگی صوتی در زیرآب محسوب می‌شوند. نوسانات جمعی این حباب‌ها فرکانس‌های پایین ایجاد می‌کنند و در محیط اطراف منتشر می‌شوند.



منابع آلودگی صوتی

ناشی از فعالیت‌های انسانی

کشتی‌ها

کشتی‌ها از مهم‌ترین منابع نویز انسانی در اقیانوس‌ها هستند و سه نوع صدای اصلی تولید می‌کنند:

ماشین‌آلات

موتورهای دیزلی، ژنراتورها و تجهیزات هیدرولیک صداهایی تولید می‌کنند که ناشی از لرزش و کارکرد تجهیزات می‌باشد.

پروانه و موتور کشتی

حرکت پروانه‌ها و تیغه‌های کشتی باعث ایجاد صداهای بلند و گسترده در فرکانس‌های مختلف می‌شوند.

آلودگی صوتی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و نظامی

فعالیت‌های صنعتی و نظامی مانند لرزه‌نگاری، حفاری و آزمایش‌های انفجاری صداهای شدیدی ایجاد می‌کنند که می‌توانند در مسافت‌های طولانی منتقل شود و بر گونه‌های دریایی اثرگذار بگذارند.

جریان آب

حرکت آب اطراف بدنه کشتی باعث ایجاد صداهایی می‌شود که شبیه یک صدای یکنواخت و ثابت است.

توربین‌های بادی دریایی

- لرزش‌های جعبه‌دنده و ژنراتور توربین‌ها در آب منتشر می‌شوند و آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند.
- عملیات نصب پایه‌ها و چکش کاری توربین‌ها موج‌های صوتی شدیدی تولید می‌کنند.

سونارها (رادارهای زیرآبی) و فعالیت‌های نظامی

سونارهای نظامی و تجاری از دیگر منابع مهم آلودگی صوتی در اقیانوس هستند. این صداهای می‌توانند ارتباطات صوتی جانوران دریایی را مختل کند و موجب افزایش استرس و اضطراب و کاهش توان تولیدمثل در آن‌ها شوند.



افزایش فعالیت‌های انسانی در اقیانوس‌ها سطح آلودگی صوتی محیط را به شدت بالا برده است. این موضوع برای پستانداران دریایی به‌ویژه نهنگ‌ها تهدید بسیار جدی محسوب می‌شود؛ زیرا این جانوران بیشتر رفتارهای حیاتی خود را از طریق صدا تنظیم می‌کنند.

کاهش فضای ارتباطی و ایجاد انزوا

آلودگی صوتی مصنوعی محدوده‌ای که نهنگ‌ها می‌توانند صدای یکدیگر را بشنوند، کاهش می‌دهد. این پدیده که به مسدود شدن سیگنال‌های صوتی شناخته می‌شود، ارتباطات آن‌ها را تضعیف کرده و جهت‌یابی گروهی را مختل می‌کند و در نهایت به انزوا و سردرگمی نهنگ‌ها می‌انجامد.

اختلال در نشانه‌های جهت‌یابی

آلودگی صوتی مصنوعی محدوده‌ای که نهنگ‌ها می‌توانند صدای یکدیگر را بشنوند، کاهش می‌دهد. این پدیده که به مسدود شدن سیگنال‌های صوتی شناخته می‌شود، ارتباطات آن‌ها را تضعیف کرده و جهت‌یابی گروهی را مختل می‌کند و در نهایت به انزوا و سردرگمی نهنگ‌ها می‌انجامد.

رفتار اجتنابی و تغییر مسیر

نهنگ‌ها در مواجهه با منابع آلودگی صوتی معمولاً مسیر خود را تغییر می‌دهند یا زیستگاه‌های کلیدی خود را ترک می‌کنند. این تغییر رفتار باعث کاهش دسترسی به منابع غذایی و اختلال در الگوهای روزمره زندگی آن‌ها می‌شود.

پیامدهای بلندمدت و در سطح جمعیت افزایش استرس، کاهش دسترسی به غذا و اختلال در تولیدمثل از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت آلودگی صوتی مصنوعی هستند که در نهایت می‌توانند باعث کاهش بقا و افت جمعیت نهنگ‌ها شوند. صداهای ناشی از سونارهای نظامی تأثیرات شدیدی بر گونه‌های خاصی از نهنگ‌ها دارند؛ واکنش این جانوران معمولاً شامل اختلال در الگوی رفتاری تغذیه، تغییر مسیر ناگهانی و رفتارهای گریز است. این فشارها، به‌ویژه در مناطق قطبی که فعالیت انسانی رو به افزایش است، تهدیدی جدی برای بقای آن‌ها محسوب می‌شود.



در دنیای زیرآب، صدا همان نقشی را دارد که نور برای انسان ایفا می‌کند. نهنگ‌ها برای آوازخوانی، پیدا کردن طعمه، مهاجرت و ارتباط اجتماعی به صدا وابسته‌اند. با این حال، فعالیت‌های انسانی مانند کشتی‌رانی، حفاری نفت و گاز، سونارهای نظامی و تردد قایق‌ها موجب افزایش چشمگیر سطح آلودگی صوتی در اقیانوس‌ها شده است.

• اثرات زیستی

آلودگی صوتی می‌تواند مستقیماً به دستگاه شنوایی نهنگ‌ها آسیب وارد کند و منجر به کاهش موقت یا دائمی شنوایی شود. این اختلال، توانایی آن‌ها در یافتن طعمه و گریز از شکارچیان را ضعیف می‌کند. قرارگیری طولانی‌مدت در معرض صداهای شدید، سبب افزایش استرس، تضعیف سیستم ایمنی، کاهش توان تولیدمثل و حتی مرگ زودرس می‌شود. در برخی موارد، مواجهه با امواج صوتی پر قدرت موجب صعود ناگهانی نهنگ‌ها به سطح آب و بروز عوارض مرتبط با تغییر فشار (مانند آمبولی گازی) شده است. همچنین، به‌گل نشستن‌های دسته‌جمعی در میان برخی گونه‌ها ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های صوتی انسانی دارد.

• اثرات رفتاری

نهنگ‌ها در حضور آلودگی صوتی شدید ممکن است مسیر مهاجرت خود را تغییر دهند، از زیستگاه‌های اصلی مانند مناطق تغذیه یا زادآوری دوری کنند و رفتارهایی نظیر گریز سریع، بی‌نظمی در گروه‌های اجتماعی یا کاهش زمان تغذیه بروز دهند. علاوه بر این، مسدود شدن سیگنال‌های صوتی توانایی برقراری ارتباط، جفت‌یابی و هماهنگی گروهی را به‌طور قابل توجهی مختل می‌کند.



REFERENCES





فاطمه شریف بیگی- کارشناسی بیوتکنولوژی

چکیده


در مناطق قطبی، ریتم های شبانه روزی متفاوت از سایر مناطق دیده می شوند. علت این پدیده، انحراف ۲۳ درجه ای محور چرخش کره زمین نسبت به صفحه مدار آن به دور خورشید است. این تفاوت در مناطق قطبی با نواحی استوایی باعث ایجاد تغییرات رفتاری، فیزیولوژیکی و دیگر تفاوت های سازشی در گونه های این مناطق می شود. از طرفی پدیده هایی مانند تغییرات اقلیمی یا گرمایش زمین نیز بر رفتار و فیزیولوژی این گونه ها تأثیرگذارند. در این مرور کوتاه به بررسی ریتم های شبانه روزی، تغییرات اقلیمی و تأثیر این عوامل بر رفتار و فیزیولوژی گونه های قطبی پرداخته می شود.

ریتم های شبانه روزی و اهمیت آنها

به دلیل شکل کره زمین، مناطق قطبی از نواحی استوایی سردتر هستند، زیرا با افزایش عرض جغرافیایی شدت تابش نور خورشید کاهش می یابد. همچنین به دلیل کج بودن محور کره زمین، در این مناطق معمولاً روزهای طولانی یا شب های طولانی دیده می شود؛ برای مثال، ۲۴ ساعت روشنائی در تابستان یا ۲۴ ساعت تاریکی در زمستان. این شرایط در قطب ها می تواند هم چالش زا و هم فرصت ساز باشد.

گونه های روز فعال در روزهای ۲۴ ساعته تابستان فرصت بیشتری برای شکار و فعالیت دارند، در حالی که برخی گونه های دیگر با اختلال در ریتم شبانه روزی خود مواجه می شوند. عامل مهم دیگر در این نواحی، تغییرات فصلی در منابع غذایی است. در تابستان، دمای بالاتر و نور فراوان باعث افزایش منابع غذایی می شود، در حالی که در زمستان تاریک و سرد، منابع غذایی تقریباً به صفر می رسد.

گونه های قطبی برای بقا، فیزیولوژی خود را با این چرخه ها هماهنگ کرده اند؛ مثلاً با افزایش متابولیسم یا ذخیره چربی در تابستان و خواب زمستانی در زمستان.



تغییرات اقلیمی و اثر آن بر ریتم های زیستی

ریتم های زیستی، فعالیت های حیاتی جاندار را کنترل می کنند و حتی بر فرآیندهای درون سلولی اثرگذارند. تغییر در شرایط محیطی می تواند این ریتم ها را مختل کرده و هماهنگی میان ساعت درونی و محیط را بر هم بزند.

در حالت عادی، ساعت درونی موجودات زنده با چرخه ی شبانه روزی زمین هماهنگ است، اما تغییرات اقلیمی می توانند این هم زمان سازی را مختل کنند.

افزایش دمای جهانی و تغییر الگوهای بارش که اغلب منشأ انسان زاد دارند، از مهم ترین عوامل این اختلال ها هستند. به عنوان مثال، تغییر زمان بندی دسترسی به مواد غذایی، فرایند تولیدمثل بهینه در گونه ها را دچار اختلال می کند. علاوه بر گرمایش زمین، آلودگی های شیمیایی (مانند فلزات سنگین و ترکیبات نفتی) و کاهش اکسیژن محلول در آب ها نیز ساعت های زیستی را مختل کرده و موجب استرس فیزیولوژیک می شوند. آلودگی نوری نیز توانایی گونه ها در تشخیص طول روز را کاهش داده و شرایط را پیچیده تر می کند. در نتیجه، **تغییرات اقلیمی و آلودگی نوری به طور هم زمان فشار تکاملی شدیدی بر گونه ها وارد می کنند و بقای آن ها را تهدید می سازند.**

پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیک

گونه های قطبی در واکنش به شرایط نوری و اقلیمی خاص، سازوکارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. برای مثال

"خرس های قطبی با وجود روزهای دائمی یا شب های مداوم، نوعی ریتم شبانه روزی را حفظ می کنند، اما شدت این ریتم ها در فصول مختلف و هنگام جست و جوی غذا یا زادآوری تغییر می کند." سنجاب های زمینی قطبی در طول تابستان تقریباً ریتم روزانه ی خود را از دست می دهند و فعالیتشان بر اساس دمای محیط و دسترسی به غذا تنظیم می شود. این مشاهدات نشان می دهد که گونه های قطبی دارای انعطاف پذیری بالایی در ریتم های زیستی خود هستند، اما برای بقا و تولیدمثل، به نشانه های محیطی ظریف وابسته اند. تغییرات اقلیمی با تغییر این نشانه ها، سازگاری بلندمدت آن ها را تهدید می کند. درک کامل این سازوکارها هنوز محدود است. برای فهم بهتر سازگاری زمانی و فیزیولوژیکی گونه های قطبی، باید مطالعات بیشتری در شرایط کنترل شده انجام شود. تاکنون چنین پژوهش هایی اندک بوده اند، اما نتایج موجود نشان می دهند که نمی توان الگوی ثابتی از سازگاری ریتم های زیستی در قطب ها ارائه داد.



REFERENCES

1. Walker, W. H., Meléndez-Fernández, O. H., Nelson, R. J., & Reiter, R. J. (2019). Global climate change and invariable photoperiods: A mismatch that jeopardizes animal fitness. *Ecology and Evolution*, 9(17), 10044-10054.
2. Hazlerigg, D. G., Appenroth, D., & Tomotani, B. M. (2023). Biological timekeeping in polar environments: Lessons from terrestrial vertebrates. *Journal of Experimental Biology*, 226(23), jeb246308.
3. Vanden Hole, C., Goyens, J., Prims, S., Fransen, E., Ayuso Hernando, M., Van Cruchten, S., Aerts, P., & Van Ginneken, C. (2017). How innate is locomotion in precocial animals? A study on the early development of spatio-temporal gait variables and gait symmetry in piglets. *Journal of Experimental Biology*, 220(15), 2706-2716.
4. Ware, J. V., & Jansen, H. T. (2020). Circadian rhythms of free-ranging polar bears. *Journal of Biological Rhythms*, 35(2), 180-194.



جمع بندی

ریتم‌های زیستی در مناطق قطبی پاسخی هستند به چرخه‌های نوری غیرمعمول، تغییرات دما و میزان آلودگی در این نواحی. این ریتم‌ها بازتابی از سازگاری پیچیده جانوران با فشارهای محیطی شدید به شمار می‌روند. با این حال، افزایش دمای جهانی، تغییر الگوهای بارش و آلودگی‌های نوری و شیمیایی، این تعادل ظریف را تهدید می‌کنند. درک بهتر از ساعت‌های زیستی در گونه‌های قطبی می‌تواند به پیش‌بینی پیامدهای آینده تغییرات اقلیمی کمک کند، موضوعی که نیازمند پژوهش‌های گسترده‌تر و میان‌رشته‌ای در این حوزه است.





مسیرهای مغزی مرتبط با مسیریابی

توانایی شگفت‌انگیز پرندگان در پیمودن هزاران کیلومتر بدون نقشه یا راهنما، ریشه در سازوکارهای عصبی پیچیده دارد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بخشی از مغز پرندگان به‌ویژه هیپوتالاموس، در فعال‌سازی رفتارهای مهاجرتی نقش کلیدی ایفا می‌کند. تغییرات کوچک در بیان ژن‌های این ناحیه کافی است تا پرنده از حالت عادی وارد وضعیت مهاجرتی شود.

یکی از یافته‌های مهم در این زمینه، افزایش فعالیت ژن APOH در پرندگان مهاجر است. این ژن به‌ویژه هنگام شب فعال‌تر می‌شود و ارتباط مستقیمی با «بی‌قراری مهاجرتی» دارد؛ حالتی که در آن پرندگان، حتی در اسارت، فعالیت شبانه‌ی بیشتری از خود نشان می‌دهند. این پدیده نشان می‌دهد که مهاجرت نه تنها رفتاری غریزی، بلکه فرایندی پیچیده با کنترل عصبی و ژنتیکی است.

معصومه حیدری - کارشناسی میکروبیولوژی

مهاجرت پرندگان یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های طبیعی است. هر ساله میلیاردها پرنده برای پیدا کردن غذا، شرایط مناسب زندگی و محل‌های مناسب برای تولیدمثل، سفرهای طولانی را آغاز می‌کنند. این جابه‌جایی‌ها علاوه بر اینکه نشان‌دهنده توانایی شگفت‌انگیز آن‌ها در سازگاری با تغییرات محیط است، نقشی مهم در تعادل و پایداری اکوسیستم‌ها دارند.




پیامدهای زیستی و بقای

مهاجرت پرندگان با تغییرات گسترده فیزیولوژیک همراه است. پرندگان پیش از سفر دچار پرخوری می‌شوند، ذخایر چربی آن‌ها تا ۵۰ درصد وزن بدن افزایش می‌یابد و حجم عضلات پرواز بیشتر می‌شود. این ذخایر انرژی برای پروازهای طولانی مدت حیاتی است. در کنار این، ریتم فعالیت روزانه نیز تغییر می‌کند؛ گونه‌هایی که معمولاً روزفعال‌اند، در فصل مهاجرت پروازهای شبانه انجام می‌دهند. با این حال، موفقیت مهاجرت تنها به سازوکارهای درونی وابسته نیست، بلکه به کیفیت زیستگاه‌های زادآوری و زمستان‌گذرانی نیز بستگی دارد. شرایط نامناسب در زیستگاه زمستانی می‌تواند بر وضعیت جسمی و انرژی پرندگان اثر منفی بگذارد و موفقیت تولیدمثل در فصل بعدی را کاهش دهد. بنابراین، ارتباط پایدار میان زیستگاه‌ها، عامل کلیدی در پایداری جمعیت‌های مهاجر است.

عوامل محیطی به‌شدت بر توانایی پرندگان در مسیریابی و زمان‌بندی مهاجرت اثر می‌گذارند. تغییرات کاربری زمین مانند تبدیل جنگل‌ها و تالاب‌ها به مناطق کشاورزی یا شهری، مسیرهای سنتی مهاجرتی را مختل می‌کند و پرندگان را ناچار به انتخاب راه‌های طولانی‌تر یا پرخطرتر می‌سازد. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی – شامل افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش – بر سیگنال‌های محیطی که پرندگان برای آغاز سفر استفاده می‌کنند اثر می‌گذارد. در نتیجه، برخی گونه‌ها زودتر یا دیرتر از موعد معمول مهاجرت می‌کنند، در حالی که منابع غذایی یا شرایط مناسب در زیستگاه‌های بین‌راهی هنوز فراهم نشده است. این ناهماهنگی، فشار زیادی بر توانایی‌های مسیریابی، حافظه فضایی و انعطاف‌پذیری رفتاری پرندگان وارد می‌کند و در نهایت بقای آن‌ها را تهدید می‌سازد.

برای مثال، غازهای پیشانی‌سفید در بهار مسیرهای پیچیده‌تر و منعطف‌تر دارند و ممکن است تغییر جهت دهند تا بهترین منابع غذایی و ذخیره انرژی لازم برای فصل تولیدمثل را پیدا کنند. اما در پاییز مسیرهایشان ساده‌تر و مستقیم‌تر است، زیرا منابع غذایی در مبدا و مقصد به‌وفور وجود دارد. این تغییرات فصلی نشان‌دهنده انعطاف مغز و رفتار پرندگان در واکنش به محیط است.



REFERENCES

1. Torstenson, M. S., Wolfson, D. W., Safran, S. M., Walton, D. J., Hallberg, A. B., Kim, D., Tan, Y. F., Kramer, G. R., & Andersen, D. E. (2024). Conservation of North American migratory birds: Insights from developments in tracking technologies. *Avian Conservation and Ecology*, 19(2), Article 13.
2. Marasco, V., Fusani, L., & Smith, S. (2024). Brain gene expression reveals pathways underlying nocturnal migratory restlessness. *Scientific Reports*, 14, Article 22420.
3. Morford, J., Wynn, J., Lewin, P., Jagers, P., Lancaster-Reeves, L., Sibeaux, A., Padget, O., & Guilford, T. (2025). Map and compass navigation: The mechanism and ontogeny of animal maps. *Animal Behaviour*.
4. Moayedī, A., Long, J. A., Kölzsch, A., Kruckenberg, H., Benitez-Paez, F., & Demar, U. (2025). Multi-modal, interrelated navigation in migratory birds: A data mining study. *Ecological Informatics*, 90, 103218.

جمع بندی

مهاجرت پرندگان فرایندی پیچیده است که ریشه در سازوکارهای عصبی، ژنتیکی و فیزیولوژیک دارد و در عین حال، به شدت از تغییرات محیطی و کیفیت زیستگاه‌ها تأثیر می‌پذیرد. شواهد علمی نشان می‌دهد که برهم خوردن زمان بندی طبیعی و مسیرهای مهاجرتی، تهدیدی جدی برای بقای گونه هاست.



ژورنال کلاب

اینجا جایی است برای گفت‌وگوی علمی و تحلیل انتقادی. در ژورنال کلاب، مقالات منتخب حوزه علوم اعصاب و روان مرور و بازخوانی می‌شوند؛ از اختلالات عصبی گرفته تا ژنتیک رشد مغز و پدیده‌هایی چون درآوو و رویا. این بخش پلی است میان پژوهش‌های روز و فهم جمعی ما از مغز – تمرینی برای تفکر تحلیلی و زیست علمی.





پارکینسون

بیماری پارکینسون (PD) یک بیماری عصبی پیشرونده است. این بیماری بعد از آلزایمر دومین بیماری عصبی شایع می باشد که شیوع آن در بین افراد 65 تا 69 سال تقریباً 0.5 تا 1 درصد است. ویژگی های بالینی بیماری پارکینسون عمدتاً مربوط به اختلالات حرکتی از جمله لرزش، سفتی عضلات، کندی حرکت و همچنین اختلالات تعادلی در برخی بیماران است. علاوه بر آن بیماران پارکینسون می توانند از مدت ها قبل از شروع اختلالات حرکتی، علائم غیر حرکتی مانند یبوست، اختلالات ادراری، افسردگی و بی خوابی را از خود بروز دهند.

این بیماری به دلیل تخریب سلول های عصبی تولیدکننده دوپامین در بخشی از مغز به نام جسم سیاه، که حرکت را کنترل می کند، رخ می دهد. دوپامین برای تنظیم و هماهنگی حرکات بدن ضروری است و کاهش آن باعث بروز مشکلات حرکتی می شود. بیماری پارکینسون یک بیماری مولتی فاکتوریال است که ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی می توانند خطر ابتلا به آن را افزایش دهند.

از عوامل محیطی می توان به مصرف دخانیات، مصرف کافئین و قرار گرفتن در معرض آفت کش ها و فلزات سنگین اشاره کرد. علاوه بر این ها در بعضی موارد وراثت خانوادگی و مندلی نیز دیده شده است. به ژن هایی که جهش در آن ها به طور بالقوه باعث پارکینسون می شوند، به ترتیب شناسایی، نام "PARK" اختصاص داده شده است. تا به امروز، 23 ژن PARK با پارکینسون مرتبط شده اند. نحوه ی توارث ژن های PARK می تواند به صورت اتوزومال غالب (LRRK2، SCNA)، و VPS32 یا اتوزومال مغلوب (PRKN، PINK1 و DJ-1) باشد.

Parkinson's disease




MULTIPLE SCLEROSIS – MS

اما در تحقیقات جدید این باور به چالش کشیده شده است؛ این نظریه‌های جدید پیشنهاد می‌کنند که همانند سایر اختلالات عصبی مانند بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون، در ام‌اس نیز نقص اولیه در CNS رخ می‌دهد.


در اکثر بیماری‌های نورودژنراتیو جهش‌های خاصی به عنوان علت خود بیماری یا زیرمجموعه‌هایی از آن بیماری شناسایی شده‌اند؛ اما در بیماری ام‌اس برخلاف سایر بیماری‌های نورودژنراتیو چنین جهش‌هایی هنوز شناسایی نشده‌اند. در عوض، تعداد زیادی از جایگاه‌های آسیب‌پذیر روی کروموزوم‌ها - که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها مربوط به عملکرد سیستم ایمنی هستند - از طریق مطالعات ارتباط در سطح ژنوم یافت شده‌اند. مثال‌هایی از این موارد شامل هاپلوتیپ‌های DO، DP، و DR کلاس II آنتی‌ژن لکوسیت انسانی (HLA) است، که ارتباط با ام‌اس را نشان می‌دهند. علاوه بر ژنتیک، خطر ابتلا به ام‌اس به شدت با عوامل محیطی، به ویژه عفونت با ویروس اِپشتین بار، قرار گرفتن در معرض آفتاب/کمبود ویتامین D و سیگار کشیدن مرتبط است.

بیماری "ام‌اس" یا مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع‌ترین علل ناتوانی عصبی در بزرگسالان است. از علائم این بیماری می‌توان به مشکلات حرکتی، ناتوانی در صحبت کردن یا خستگی و مورمور شدن بدن اشاره کرد. به صورت سنتی محققین بر این باور هستند که در بیماری ام‌اس سلول‌های T به صورت تنظیم نشده وارد پارانشیم سیستم عصبی مرکزی (CNS) می‌شوند و همراه با ماکروفاژها و سلول‌های B به بخش‌های مختلف CNS از جمله میلین به عنوان هدف اصلی حمله می‌کنند.


Multiple Sclerosis



Normal Nerve



Multiple Sclerosis




نقص اندامک میتوکندری نیز می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشرفت فاز پیشرونده بیماری ام‌اس ایفا کند. میتوکندری نقش محوری در تأمین انرژی برای آکسون‌ها و نورون‌های فعال ایفا می‌کند. آکسون‌های دمی‌لینه برای انتقال پیام الکتریکی نیاز به صرف انرژی خیلی بیش‌تری دارند. وقتی میتوکندری‌ها نتوانند ATP کافی تأمین کنند، آکسون‌ها وارد حالت استرس انرژی می‌شوند و زمینه آسیب و مرگ نورونی فراهم می‌شود، از طرف دیگر میتوکندری معیوب به جای تولید انرژی سالم، مقادیر زیادی رادیکال آزاد تولید می‌کند که این رادیکال‌ها به پروتئین‌ها، لیپیدها و DNA آسیب می‌زنند و باعث مرگ تدریجی سلول می‌شوند.


آلزایمر

نظریه دیگر عامل آلزایمر را تشکیل‌گره‌های نوروفیبریلاری با واسطه تائو می‌داند. پروتئین TAU در حالت عادی به میکروتوبول‌ها در آکسون سلول‌های عصبی متصل و پایداری و یکپارچگی اسکلت سلولی را حفظ می‌کند. در آلزایمر، TAU دچار فسفریلاسیون بیش از حد می‌شود، در نتیجه TAU از میکروتوبول جدا، میکروتوبول ناپایدار و در نتیجه انتقال پیام عصبی در آکسون مختل می‌شود.

بیماری آلزایمر (AD) شایع‌ترین اختلال نورودژنراتیو و علت اصلی زوال عقل در سراسر جهان است که بین 60 تا 80 درصد از کل موارد زوال عقل را تشکیل می‌دهد. برآوردهای فعلی نشان می‌دهد که تقریباً 50 میلیون بیمار در سراسر جهان با آلزایمر زندگی می‌کنند و میزان بروز آن در جمعیت‌های مسن به طور چشمگیری در حال افزایش است. آلزایمر با اختلال عملکرد شناختی پیشرونده و اختلال رفتاری مشخص می‌شود و با از دست دادن حافظه، آفازی (اختلال زبان)، آگنوزی (ادراک پیریشی)، اختلال بینایی-فضایی، نقص در تفکر انتقادی، محاسبه و در نهایت با تغییرات شخصیتی و رفتاری همراه است؛ تا جایی که توانایی بیماران در انجام فعالیت‌های روزانه به طور مستقل، به شدت مختل می‌شود و در نهایت آنها را بستری و نیازمند مراقبت مداوم می‌کند. نظریه‌های مختلفی در ارتباط با علت بروز بیماری آلزایمر وجود دارد. اولین نظریه بیان می‌کند که در آلزایمر پروتئین خاصی به نام «آمیلوئید بتا» در مغز رسوب می‌یابد که عملکرد سلول‌های مغزی را مختل کرده و منجر به بروز علائم آلزایمر می‌شود.



نظریه‌های جدیدتری نیز وجود دارند که این نظریه‌ها روی نقش میتوکندری‌ها در بروز آلزایمر تمرکز دارند. میتوکندری‌ها به عنوان تولیدکنندگان اصلی انرژی مغز، ATP مورد نیاز نوروها را تولید می‌کنند، همچنین علاوه بر تولید انرژی، در تنظیم کلسیم، کاهش رادیکال‌های آزاد و کنترل آپوپتوز در نوروها نیز نقش دارد؛ در نتیجه هر نقصی در میتوکندری‌ها باعث اختلال در عملکرد نوروها می‌شود.



REFERENCES

- 1- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536722/>
- 2- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6915812/>
- 3- <https://eurjmedres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40001-025-02886-9>





زهرا یارمحمدی، دکتری زیست‌شناسی جانوری-سلولی تکوینی

رشد مغز در انسان، قبل از تولد، توسط برنامه‌های ژنومی تنظیم شده زمانی و مکانی خاص که در سلول‌های بنیادی و پیش‌ساز عصبی فعالیت می‌کنند، هدایت می‌شود. این برنامه‌ها توسط مسیرهای سیگنالینگ حفاظت شده NOTCH, SHH, WNT/B-CATENIN هماهنگ شده و توسط شبکه‌های رونویسی و اپی‌ژنتیک لایه‌ای اجرا می‌شوند. هر گونه اختلال در چرخه سلولی، ژن‌های مرتبط با مهاجرت و یا تنظیم‌کننده‌های کروماتینی در طول پنجره‌های زمانی تعریف شده قبل از تولد، ناهنجاری‌های کاملاً مشخصی مانند میکروسفالی اولیه و لیسنسفالی ایجاد می‌کند. پیشرفت‌ها در رونویسی تک سلولی و اپی‌ژنومیک شروع به حل مسیرهای تنظیمی ژن خاص سلول در طول بارداری انسان کرده‌اند. همچنین این پیشرفت‌ها، ژن‌های مشکوک به بیماری را به جمعیت‌های سلولی دقیق قبل از تولد مرتبط می‌کنند.


این توالی‌ها شامل: القای عصبی و عصب‌زایی در جنین‌زایی اولیه (هفته سوم تا چهارم پس از لقاح)، الگوسازی منطقه‌ای مغز میانی، گسترش بخش‌های پیش‌ساز عصبی (مناطق بطنی و زیربطنی)، نوروژنز با توالی لایه‌ای از داخل به خارج، مهاجرت شعاعی، تشکیل سیناپس‌ها که در اواخر زندگی جنینی آغاز می‌شود و گلیوژنز که قبل از تولد تشدید می‌شود و پس از تولد ادامه می‌یابد، است. تمامی این مراحل، در اصل سازنده چارچوب سلولی هستند که برنامه‌های ژنومی بر اساس این چارچوب‌ها عمل می‌کنند.

رشد قشر مغز انسان توسط یکسری توالی مشخص از رویدادها پیش می‌رود

این توالی‌ها شامل: القای عصبی و عصب‌زایی در جنین‌زایی اولیه (هفته سوم تا چهارم پس از لقاح)، الگوسازی منطقه‌ای مغز میانی، گسترش بخش‌های پیش‌ساز عصبی (مناطق بطنی و زیربطنی)، نوروژنز با توالی لایه‌ای از داخل به خارج، مهاجرت شعاعی، تشکیل سیناپس‌ها که در اواخر زندگی جنینی آغاز می‌شود و گلیوژنز که قبل از تولد تشدید می‌شود و پس از تولد ادامه می‌یابد، است. تمامی این مراحل، در اصل سازنده چارچوب سلولی هستند که برنامه‌های ژنومی بر اساس این چارچوب‌ها عمل می‌کنند.



مسیرهای سیگنالینگ دخیل در الگوهای اجدادی




در این میان تعدادی از مسیرهای سیگنالینگ وجود دارند که سلول های پیش ساز را الگو بندی کرده و در اصل تصمیم گیرنده سرنوشت سلول ها می باشند. از جمله این مسیرها، می توان به مسیر سیگنالینگ NOTCH اشاره نمود. فعال ماندن این مسیر سبب می شود سلول های گلیا در وضعیت پیش سازی باقی بمانند که این عمل با فعال کردن عوامل پایین دست (خانواده HES) که سرکوب کننده ژن های پیش عصبی هستند، سبب می شود گلیاهای شعاعی در حالت پیش ساز باقی بمانند.

مسیر سیگنالینگ SHH و FGFS نشانه های شکمی سازی (که برجسته ترین آنها برای گانگلیون های قاعده ای و سرنوشت های تانسفالیک شکمی است) را فراهم می کند و تکثیر پیش سازها را در برخی زمینه ها تعدیل می کند؛ FGF ها (به ویژه FGF8) در الگو دهی قدامی-خلفی و ناحیه ای قشر مغز و تکثیر پیش سازها نقش دارند.

مسیر بعدی مسیر WNT/B-CATERIN می باشد. غلظت های WNT الگوی پشتی-شکمی و تکثیر پیش سازها را در مغز میانی تنظیم می کنند. فعالیت WNT گسترش پیش سازها را افزایش می دهد و بر برنامه های سرنوشت ناحیه ای در قشر در حال رشد تأثیر می گذارد. WNT با مسیرهای NOTCH و FGF تعامل دارد تا پیامدهای پیش سازها را شکل دهد.

تصویر شماره 2: قبل از زیرعنوان مسیر سیگنالینگ (SHH) SONIC HEDGEHOG و FGFS



REELIN/TGF- β SIGNALING: ریلین، یک پروتئین ماتریکس خارج سلولی که توسط سلول های تفکی کاخال ترشح می شود، نقش مرکزی در مهاجرت شعاعی و قرارگیری لایه ای نورون های قشر مغز دارد. از دست دادن سیگنالینگ ریلین باعث مهاجرت شدید و نقص در لایه بندی می شود.

در اینجا لازم است به این موضوع اشاره نمود که این مسیرهای سیگنالین بعضا دارای تداخلات بوده؛ برای مثال، NOTCH و WNT در تنظیم تکثیر و تمایز سلول های پیش ساز با هم تلاقی می کنند؛ در نتیجه رفتار نوظهور جمعیت های پیش ساز قشری به وضعیت یکپارچه این شبکه های سیگنالینگ بستگی دارد.

برنامه ریزی لایه بندی مغز

مطالعات رونویسی تک سلولی از قشر مغز جنین انسان، این مسیرها را مشخص کرده و فعال سازی برنامه های ژنی مختص هر مرحله را همزمان با انتقال پیش سازها به نورون ها نشان می دهد.

تنظیم اپی ژنتیک و عناصر کنترل NON-CODING

گذار از پیش ساز به نورون، با برنامه ریزی مجدد گسترده دسترسی کروماتین، نشانه های هیستون و فعالیت تقویت کننده همراه است. پروفایل اپی ژنومیک تک سلولی قشر جنین انسان نشان می دهد که تغییرات وضعیت کروماتین مقدم بر تصمیمات دودمانی و همراه با آن است و همچنین فعال سازی برنامه های اختصاصی نورون و سرکوب شبکه های پیش ساز را ممکن می سازد. بسیاری از انواع ریسک رشد عصبی به عناصر تنظیمی غیرکدکننده فعال در مغز قبل از تولد نگاشت می شوند که اهمیت زمینه اپی ژنومیک را در تفسیر ریسک ژنتیکی تقویت می کند.

درون نورون های پیش ساز و تازه متولد شده، مجموعه ای از فاکتورهای رونویسی تصمیماتی را در مورد سرنوشت و هویت لایه های مغزی اجرا می کنند.

PAX6 و SOX2 هویت اولیه گلیاهای شعاعی و الگوسازی منطقه ای را مشخص می کنند. EOMES/TBR2 پیش سازهای میانی را مشخص می کنند که عامل تقویت خروجی نورونی هستند. بیان متوالی فاکتورهای رونویسی مانند TBR1، BCL11B/CTIP2، FEZF2 و SATB2 هویت نورون های لایه عمیق در مقابل لایه بالایی را در توالی درون به بیرون قشر مغز پستانداران سازماندهی می کند.

این مجموعه داده ها برای نقشه برداری از بیان ژن مرتبط با بیماری انواع سلول های مجزای پیش از تولد، ضروری هستند.



REFERENCES



Neuro Biom

۷۸



تأثیر خواب

مغز و آگاهی

این وضعیت امکان ترکیب خلاقانه خاطرات را فراهم می کند و نتیجه آن رؤیاهایی است که از تکه های حافظه ساخته می شوند، نه بازسازی کامل رویدادها. این امر سبب شده برخی پژوهشگران رؤیا را پدیده ای «فرعی» بدانند که بازتاب بازآرایی حافظه است، نه تجربه ای مستقل از واقعیت.

در حوزه فلسفه ذهن، یافته های اخیر مرز میان آگاهی بیداری و خواب را مبهم تر کرده اند. برخلاف دیدگاه رئالیسم ادراکی که تجربه را بازتاب مستقیم واقعیت می داند، شواهد نشان می دهند که ادراک - چه در خواب و چه در بیداری - ساختاری درونی و حافظه محور است. افزون بر این، مسئله ای «خود» و «اراده» نیز بازاندیشی می شود؛ زیرا در خواب کنترل ارادی و خودآگاهی کاهش می یابد، با این حال نوعی آگاهی زیرسطحی تداوم دارد.

آرمین آهنگری - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

پژوهش های اخیر (۲۰۲۴-۲۰۲۵) نشان می دهند که خواب نه یک حالت منفعل، بلکه فرایندی پویا و چند وجهی در مغز است که هم بر حافظه و هم بر آگاهی تأثیر عمیقی دارد. مطالعات جدید از جمله کارهای بودسون و پلر (۲۰۲۵) بر پایه «نظریه حافظه آگاهی» نشان می دهند که تجربه آگاهانه - از ادراک های روزمره تا رؤیا - بر پایه همان سازوکارهای حافظه صریح شکل می گیرد. در واقع، مغز در خواب نیز به پردازش و باز فعال سازی اطلاعات حافظه می پردازد؛ با این تفاوت که تنها بخش کوچکی از این فرایندها به صورت رؤیا در سطح آگاهی ظاهر می شود و بخش عمده آن در سطح ناخودآگاه باقی می ماند. از همین رو، پیوستگی خودآگاهی پس از بیداری وابسته به سلامت همین سامانه های حافظه است.


از دیدگاه عصب شناسی، خواب با تغییر چشمگیر در یکپارچگی اطلاعات مغزی همراه است. تحقیقات لویی و همکاران (۲۰۲۴) با استفاده از شاخص های هم افزایی اطلاعات نشان داده اند که در خواب عمیق و بیهوشی، ارتباط بین شبکه های مغزی - به ویژه شبکه پیش فرض - تضعیف می شود، اما با بازگشت آگاهی دوباره فعال می گردد. این یافته ها با نظریه های اطلاعات یکپارچه و کار جهانی هم گرا همسوست و نشان می دهد که در خواب، مغز به صورت جزیره ای تر عمل می کند و تجربه آگاهانه به حداقل می رسد.

در مقابل، در خواب REM که بیشترین رؤیاها در آن رخ می دهند، فعالیت شبکه های پیش فرض و قشر پیش پیشانی تا حدی حفظ می شود.



خواب نقشی اساسی در تثبیت و سازماندهی حافظه و شکل دهی به تجربه آگاهانه ایفا می کند. آگاهی در خواب و بیداری بر شبکه های مغزی مشابهی استوار است، اما شدت و کیفیت آن تفاوت دارد. کاهش یکپارچگی اطلاعات در خواب عمیق و تداوم نسبی آن در خواب REM بیانگر پیوستگی ظریف میان مغز، حافظه و آگاهی است. در عین حال، پرسش های بنیادین درباره ماهیت دقیق تجربه ذهنی در خواب و ارتباط آن با خودآگاهی همچنان بی جواب مانده و نیازمند پژوهش های تجربی و نظری عمیق تری هستند.

اثر مواد روان گردان بر مغز و آگاهی



پژوهش های جدید سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می دهند که مواد روان گردان کلاسیک مانند سیلوسایبین، LSD و کتامین می توانند به شکل چشمگیری ساختار و پویایی شبکه های مغزی و کیفیت آگاهی را دگرگون کنند. این مواد، بر خلاف داروهای خواب آور یا بیهوش کننده، آگاهی را خاموش نمی کنند بلکه الگوی آن را تغییر می دهند؛ به گونه ای که مرزهای معمول بین شبکه های مغزی و حتی بین خود و جهان بیرونی محو می شود.

مطالعه ی کریمل و همکاران (۲۰۲۴) با استفاده از تصویربرداری پیشرفته مغز نشان داد که دوز بالای سیلوسایبین موجب کاهش همگام سازی و تمایز بین شبکه های مغزی - به ویژه شبکه وضعیتی پیش فرض - می شود؛ شبکه ای که با احساس «خود» و زمان در ارتباط است. کاهش پایدار ارتباط میان DMN و هیپوکامپ قدیمی هفته ها پس از مصرف ادامه دارد و احتمالاً به پلاستیسیته سیناپسی و اثرات درمانی پایدار دارو مرتبط است. یافته های مشابه از سوبراهمانیان و همکاران (۲۰۲۵) نیز کاهش اتصال عملکردی DMN و در عین حال افزایش پیچیدگی سیگنال های عصبی (آنتروپی و تنوع فعالیت مغزی) را گزارش کرده اند. این تضاد ظاهری (کاهش نظم شبکه ها اما افزایش پیچیدگی کلی) نشان می دهد که مغز در حالت روان گردان در وضعیتی «آزادتر و گشوده تر» از پردازش های معمول عمل می کند.

از منظر علوم شناختی، پژوهش جانگ و همکاران (۲۰۲۴) با تحلیل یادگیری ماشینی نشان داد که مغز در حالت روان گردان نه شبیه خواب عمیق - که در آن شبکه ها جدا افتاده اند - و نه شبیه بیداری عادی است، بلکه وضعیتی فوق یکپارچه دارد. به عبارت دیگر، LSD و مواد مشابه، میدان آگاهی را گسترش می دهند و درک، تخیل و احساس خودآگاهی را دگرگون می سازند، بی آنکه آگاهی را خاموش کنند.





در حوزه فلسفه ذهن، این یافته‌ها مناقشات عمیقی را برانگیخته‌اند. برخی فیلسوفان مانند لاسونچ (۲۰۲۵) معتقدند که روان گردان‌ها می‌توانند نوعی «آگاهی خالص» یا تجربه‌ی بی‌محتوا و غیرشخصی پدید آورند؛ تجربه‌ای مشابه با عرفان و مراقبه‌ی عمیق. این دیدگاه، موسوم به پرنیالیسم نرم، بر شباهت پدیدارشناختی میان تجارب عرفانی و روان گردان تأکید دارد. با این حال، منتقدانی مانند متزینگر هشدار می‌دهند که نباید این حالات را نشانه‌ای از «ماهیت واقعی آگاهی» دانست، زیرا ممکن است صرفاً حاصل آشفتگی تصادفی نورونی باشند.

به‌طور کلی، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مواد روان گردان نه تنها ساختار عصبی مغز را موقتاً بازآرایی می‌کنند، بلکه میدان آگاهی را از حالت عادی به طیفی گسترده‌تر از تجربه‌های ذهنی منتقل می‌سازند که از انحلال خود و احساس یگانگی با جهان تا بینش‌های شناختی یا معنوی عمیق را شامل می‌شود. این پدیده‌ها از منظر نظریه‌های آگاهی مانند کار جهانی هم‌گرا و اطلاعات یکپارچه به‌عنوان نمونه‌های زنده‌ای از پویایی متغیر آگاهی تلقی می‌شوند.

مواد روان گردان تصویری نو از رابطه مغز و آگاهی ارائه می‌دهند. آن‌ها از یک سو موجب افزایش پیچیدگی و انعطاف شبکه‌های مغزی و از سوی دیگر سبب تجارب ذهنی گسترده‌تر و گاه عرفانی می‌شوند. با وجود پیشرفت‌های اخیر، هنوز روشن نیست که آیا این حالات به درک ژرف‌تری از ذات آگاهی منجر می‌شوند یا صرفاً بازتابی زیستی از آشفتگی عصبی‌اند. پاسخ به این پرسش نیازمند همکاری میان نوروساینس، روان‌شناسی شناختی و فلسفه ذهن است تا ماهیت واقعی «آگاهی دگرگون‌شده» در پرتو داده‌های علمی و تحلیلی آشکار شود.

REFERENCES



ذره بین

در «ذره بین»، نگاهی نزدیک تر به چهره ها، آثار و دستاوردهای الهام بخش در دنیای نوروساینس می اندازیم. از پروژه های جاه طلبانه ای مانند «مغز آبی» هنری مارکرام تا روایت های انسانی الیور ساکس و مستندهای علمی-احساسی. همچنین پژوهشگران ایرانی پیشرو در علوم اعصاب را معرفی می کنیم تا نشان دهیم علم، مرزی نمی شناسد و در هر ذهن مشتاقی جوانه می زند.



سکته مغزی؟

نه تنها نقطه پایان نیست

بلکه شروع شناخت عمیق خود است.

مستند MY BEAUTIFUL BROKEN BRAIN

روایت زندگی زنی ۳۴ ساله به نام لوتیسا فرنریس است که ناگهان به سکته مغزی از نوع خون‌ریزی دهنده دچار می‌شود. این اتفاق باعث مختل شدن توانایی‌های اساسی مثل درک صحیح از واقعیت اطراف، خواندن و فهم زبان او می‌شود. با وجود ناامیدی‌ها و شکست‌های مکرر در روش‌های درمانی مختلف، جلسات گفتاردرمانی و تمرین‌های شناختی، وارد مرحله بازتوانی شد و ایمانی که به توانایی مغز برای ترمیم داشت، او را سرپا نگه داشت.

این مستند روایتگر داستانی فاجعه نیست، بلکه برای سفری از دل تاریکی تا کشف دوباره هویت فردی بوده است.

آیا امکان بازگشت


پس از سکته مغزی وجود دارد؟

۱. با وجود دوره‌ی پر از ناامیدی و استرس شدید برای اکثر بیماران، روش‌های توانبخشی می‌توانند بخش قابل توجهی از عملکردهای از دست رفته را بازگردانند یا جایگزین کنند.

۲. اگر آسیب کامل بازسازی نشود، بازتوانی مغز و انعطاف‌پذیری عصبی می‌توانند تا حد زیادی به بهبود عملکردها کمک کنند.

۳. تغییرات در سکته مغزی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هستند، پس نیازمند صبر، انگیزه فردی و حمایت اجتماعی می‌باشد.

NETFLIX
A NETFLIX DOCUMENTARY
MY BEAUTIFUL
BROKEN BRAIN



مغزی دوباره

زاده‌ای پر امید

برای ارزیابی انعطاف‌پذیری عصبی، از ابزارهای تصویربرداری عصبی مانند FMRI، EEG و FNIRS استفاده می‌شود. همچنین، مقیاس‌های بالینی مانند ارزیابی فوگل-مایر (FMA) و مقیاس رانکین اصلاح‌شده (MRS) برای سنجش عملکرد بیماران به کار می‌روند.

مداخلات مؤثر در بازتوانی مغز:

۱. تحریک مغزی غیرتهاجمی (NIBS):

افزایش فعالیت مغز در نواحی آسیب دیده و کمک به بازسازی عملکردهای حرکتی و شناختی با استفاده از روش‌هایی مانند تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (TMS) و تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (TDCS)

۲. تمرینات شناختی و حرکتی:

بازیابی عملکردهای از دست رفته و تقویت مسیرهای عصبی جدید با استفاده از حرکت محدودشده (CIMT) و تمرینات مکرر

۳. داروهای بازسازی عصبی: شبیه‌سازی اثرات فیزیوتراپی در مدل‌های حیوانی شبیه سازی شده و بازسازی عملکردهای مغزی

لولا، زنی ۳۴ ساله که زندگی معمولی داشت. صبح‌ها طبق روال بیدار می‌شد و سرکار میرفت، مثل هر انسان دیگری فکر می‌کرد فردا هم شبیه دیروز خواهد بود. اما یک روز، ناگهان همه چیز در عرض چند ثانیه تغییر کرد و لولا سکتی ای خون‌ریزی دهنده در مغزش رخ داد و زندگی‌اش را از هم پاشید. لولا وقتی چشمانش را در بیمارستان باز کرد و دید دیگر هیچ چیز مثل قبل نبود، تصمیم گرفت به جای تماشای ناتوانی‌هایش وارد مسیر مبارزه شود.

مسیر مبارزه آسان نبود، اما موبایلش را برداشت و شروع کرد خودش را ثبت کردن با همان حال خراب و ذهنی آشفته. او نمی‌خواست فقط زنده بماند، می‌خواست بفهمد چه بر سرش آمده. با وجود خستگی طاقت فرسا و ناامیدی‌هایی که باعث می‌شد او را زمین بزند اما او جلسات گفتار درمانی، شرکت دوباره در جمع‌ها و تمرینات شناختی را انجام می‌داد، برای لولا حتی گفتن یک کلمه درست مانند فتح قله‌های بزرگ بود.




پیام‌های امید بخش و علمی

مسیر مبارزه آسان نبود، اما موبایلش را برداشت و

مفهوم (NEUROPLASTICITY) به معنای این است که مغز همیشه در حال یادگیری و بازسازی است، در سکتۀ مغزی هر تلاش کوچک ارزشمند است، زیرا تمرینات شناختی، حرکتی و گفتاردرمانی هرچقدر هم کوچک به نظر برسند، می‌توانند مسیرهای جدید عصبی ایجاد کنند و باعث پیشرفت شوند.

بسیاری از افرادی همانند لولا که سکتۀ را تجربه کرده‌اند، بعد از بازتوانی، دیدی عمیق‌تر نسبت به زندگی و ارزش توانایی‌هایشان پیدا می‌کنند.

**"برای بازتوانی ذهنت
حاضری هر روز یک قدم کوچک برداری؟"**



REFERENCES



Neuro Biom

مقدمه

کتاب «مردی که همسرش را با کلاه اشتباه گرفت» در سال ۱۹۸۵ نوشته الیور ساکس "OLIVER SACKS"، نورولوژیست و نویسنده‌ی برجسته‌ی بریتانیایی-آمریکایی، یکی از تأثیرگذارترین آثار در حوزه‌ی علوم اعصاب و پزشکی روایت‌محور است. این کتاب نه یک مقاله‌ی خشک علمی است و نه صرفاً اثری ادبی؛ بلکه ترکیبی است از مشاهد‌ی دقیق بالینی، توصیف‌های علمی و نگاهی عمیق انسانی به بیماران مبتلا به اختلالات عصبی.

PICADOR

THE MAN WHO MISTOOK HIS WIFE FOR A HAT




OLIVER SACKS

'A wonderful book... full of wonder, wonders and wondering.' PUNCH

پیام بنیادین کتاب آن است که مغز انسان، با تمام پیچیدگی‌ها و توانایی‌های حیرت‌انگیزش، در برابر آسیب‌ها و بیماری‌ها نیز بسیار شکننده است. ساکس نشان می‌دهد که اختلالات عصبی تنها «نقص»‌هایی در کارکرد مغز نیستند، بلکه تجربه‌هایی انسانی‌اند که بر هویت فرد، روابط اجتماعی و کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارند. او به مخاطب یادآور می‌شود که پشت هر پرونده‌ی پزشکی، انسانی با داستان زندگی منحصر به فرد حضور دارد. همین تلفیق «علم» و «انسانیت» است که اثر او را از سایر متون نورولوژی متمایز کرده است.

داستان‌های کلیدی کتاب

کتاب شامل مجموعه‌ای از ۲۴ روایت بالینی است که هرکدام گوشه‌ای از پیچیدگی‌های عملکرد مغز را روشن می‌سازند:



-داستان اصلی «مردی که همسرش را با کلاه اشتباه گرفت»: بیمار دکتر ساکس، نوازنده‌ای باهوش و مهربان بود که به پروسوپاگنوزیا «چهره نابینایی» دچار شده بود. او قادر به تشخیص چهره‌ها نبود و حتی همسرش را با کلاه اشتباه گرفت. این مورد به‌طور نمادین نشان می‌دهد که چگونه مغز می‌تواند در پردازش اطلاعات بصری دچار نقص شدید شود، در حالی که سایر توانایی‌ها تقریباً دست نخورده باقی بمانند.

-**بیماری با سندروم تور:** این اختلال عصبی باعث می‌شود فرد حرکات ناگهانی و غیرارادی «تیک‌های حرکتی» و صداهای غیرقابل کنترل «تیک‌های صوتی» داشته باشد. نکته‌ی جالب داستان در کتاب ساکس این است که وقتی بیمار در حال نواختن درام است یا تمرکز کامل روی موسیقی دارد، علائمش تقریباً ناپدید می‌شوند. این مورد نشان می‌دهد که مغز در شرایط خلاقانه یا تمرکز شدید می‌تواند راه‌هایی برای کنترل یا کاهش تیک‌ها پیدا کند، حتی وقتی بیماری شدید باشد.

Tourette's syndrome

-**بیماری که نیمه‌ی چپ دنیا را نمی‌دید:** این بیمار دچار اختلالی به نام نیمه غفلت فضایی "SPATIAL NEGLECT" بود که معمولاً بر اثر آسیب به نیمکره‌ی راست مغز رخ می‌دهد. او فقط نیمی از محیط اطرافش را مشاهده و به آن واکنش نشان می‌داد. برای مثال تنها نیمه‌ی راست بشقاب غذا یا صورت خود را اصلاح می‌کرد و نیمه‌ی چپ را نادیده می‌گرفت. داستان او نشان می‌دهد که مغز چقدر برای درک کامل فضا و محیط پیرامون ما حیاتی است و حتی آسیب کوچک می‌تواند تجربه‌ی فرد از واقعیت را به شدت تغییر دهد.


-**زنی که نمی‌توانست حس خود از بدنش را پیدا کند:** این زن دچار اختلالی به نام از دست دادن حس پیکری "LOSS OF BODY AWARENESS" بود و بدنش را همچون شیئی خارجی تجربه می‌کرد. او قادر نبود موقعیت اعضای بدن خود را درک کند و حتی هنگام لمس یا حرکت دادن بدنش احساس غریبی داشت. داستان او نشان می‌دهد که ادراک ما از «خود» تا چه حد وابسته به عملکرد سیستم عصبی است و هر اختلالی می‌تواند حس هویت و ارتباط فرد با بدنش را دچار تغییر کند.



مفاهیم

نوروساینس در کتاب

الیور ساکس در خلال روایت‌ها، مفاهیم علمی را به شکلی ساده اما دقیق بیان می‌کند. مهم‌ترین نکات نوروساینس در کتاب عبارت‌اند از:



کارکرد لوب‌های مغزی

لوب پس‌سری: پردازش دیداری


لوب گیجگاهی: تشخیص چهره و پردازش موسیقی

لوب پیشانی: تصمیم‌گیری، حرکت ارادی و کنترل رفتار

لوب آهیانه‌ای: ادراک فضایی و حس پیکری

پلاستیسیته عصبی NEUROPLASTICITY مغز قادر است تا حدودی خود را بازسازی کند.

بیماران کتاب نشان می‌دهند که حتی در حضور اختلال، مغز راه‌های جبرانی تازه‌ای می‌سازد. مثلاً بیماری که توانایی زبانی خود را از دست داده بود، از موسیقی به عنوان ابزاری برای ارتباط استفاده می‌کرد.



رابطه‌ی مغز و هویت

کتاب ثابت می‌کند که اختلال در بخش

کوچکی از مغز می‌تواند تغییرات عمیقی در شخصیت، رفتار و حتی تجربه‌ی فرد از «واقعیت» ایجاد کند.

مرز نازک میان نرمال و غیرنرمال برخی بیماران، علیرغم نقص‌ها، توانایی‌های خارق‌العاده‌ای

داشتند. ساکس می‌نویسد: «گاهی بیماری، استعدادهای پنهان ذهن را آشکار می‌کند.» این نگاه باعث می‌شود ما بیماران را نه تنها به عنوان افراد آسیب‌دیده، بلکه به عنوان انسان‌هایی با ظرفیت‌های ویژه ببینیم.



تأثیر کتاب

بر علم و جامعه

از منظر اجتماعی، کتاب به خوانندگان عام کمک کرد تا بیماران مبتلا به اختلالات عصبی را نه تنها به عنوان «بیمار» بلکه به عنوان «انسان» ببینند. این تغییر نگاه، باعث کاهش برچسب‌زنی اجتماعی و افزایش همدلی نسبت به افراد مبتلا شد.

از منظر فرهنگی، اثر ساکس الهام بخش آثار هنری و فرهنگی بسیاری شد. نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها و حتی آثار موسیقایی براساس روایت‌های او ساخته شدند. کتاب به نوعی پلی میان علم و هنر ایجاد کرد و نشان داد که علوم اعصاب می‌توانند موضوعی برای ادبیات و فلسفه نیز باشد.

از منظر علمی، انتشار این کتاب نقطه‌ای عطفی در تاریخ پزشکی بود. تا پیش از آن، بیشتر متون نورولوژی مجموعه‌ای از تعاریف و علائم بودند، اما ساکس نشان داد که مطالعه‌ی بالینی باید با روایت انسانی همراه شود. اثر او الهام‌بخش بسیاری از عصب‌شناسان و روان‌پزشکان شد تا به تجربه‌ی زیسته‌ی بیماران نیز اهمیت دهند.

همچنین باعث شد رشته‌ی نورولوژی روایت‌محور "NARRATIVE NEUROLOGY" شکل بگیرد که به استفاده از داستان در آموزش و درمان می‌پردازد.

نتیجه‌گیری

کتاب «مردی که همسرش را با کلاه اشتباه گرفت» تنها گزارشی از اختلالات عصبی نیست؛ این اثر تلاشی است برای کشف ماهیت ذهن و انسانیت. الیور ساکس با ترکیب دانش پزشکی و روایت‌های انسانی نشان می‌دهد که هر اختلال، دریچه‌ای تازه به شناخت مغز و روان است. تأثیر ماندگار کتاب در علم، جامعه و فرهنگ ثابت می‌کند که پرداختن به بیماری‌های عصبی صرفاً یک موضوع پزشکی نیست، بلکه بخشی از درک ما از معنای «انسان بودن» است.



REFERENCES




Neuro Biom



زینب زارعی، زهرا محمدجانی-کارشناسی زیست شناسی گیاهی

هنری مارکرام، دانشمند برجسته علوم اعصاب، با نگاهی آینده‌نگر باور دارد شبیه سازی مغز می‌تواند به شناخت عمیق‌تر آگاهی انسان و کشف درمان‌های نوآورانه برای اختلالات عصبی منجر شود.



© Blue Brain Project/EPFL 2005 - 2020. All rights reserved

از نورون تا کیهان دیجیتال

در دل آلپ سوئیس، در دانشگاه EPFL، رویایی بلندپروازانه در حال شکل‌گیری است که ممکن است آینده علم و بشریت را دگرگون کند. این رویا، شبیه‌سازی کامل مغز انسان در فضای دیجیتال است؛ پروژه‌ای که با نام «مغز آبی» شناخته می‌شود و توسط دانشمند ویژه‌ای به نام هنری مارکرام رهبری می‌گردد.

تصور کنید قادر باشیم هر نورون، هر سیناپس و هر جریان الکتریکی درون مغز را با دقتی بی‌نظیر در کامپیوترهای ابرقدرتمند بازسازی کنیم. این دیگر محدود به قلمرو علمی‌تخیلی نیست، بلکه واقعیتی است که مارکرام و تیمش در حال محقق ساختن آن هستند. پروژه مغز آبی نه تنها یکی از جاه‌طلبانه‌ترین تلاش‌های علمی قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود، بلکه پلی است میان جهان میکروسکوپی نورون‌ها و جهان کلان رفتار انسانی.

در عصری که بیماری‌های مغزی همچون آلزایمر، پارکینسون و اسکیزوفرنی میلیون‌ها انسان را درگیر کرده‌اند، درک عمیق‌تر از مکانیسم‌های مغزی نه تنها یک کنج‌کاوی علمی، بلکه ضرورتی انسانی محسوب می‌شود. چالش اصلی در این مسیر، پیچیدگی بی‌نظیر مغز انسان است. درک جامع این «کیهان کوچک» دشوار و پیچیده است.

در این مرحله، نوآوری اصلی پروژه مغز آبی نمایان می‌شود؛ تلاشی که با ترکیب داده‌های آزمایشگاهی، مدل‌سازی ریاضی و توان محاسباتی ابررایانه‌ها، ساختار و عملکرد مغز را در سطح سلولی بازسازی می‌کند.



معرفی هنری مارکرام

هنری مارکرام، استاد برجسته دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان (EPFL)، در سال ۱۹۶۲ در صحرای کالاهاری آفریقای جنوبی؛ محیطی که شاید بتوان آن را نقطه آغاز یک سفر علمی استثنایی دانست متولد شد. او پس از پایان تحصیلات دبیرستان در کالج کرسنی (KEARSNEY)، در دانشگاه کیپ تاون هم‌زمان در رشته‌های پزشکی و علوم اعصاب تحصیل کرد و در سال ۱۹۸۸ مدرک کارشناسی خود را در فیزیولوژی همراه با تاریخ و فلسفه علم دریافت نمود. این ترکیب میان‌رشته‌ای پایه‌ای برای دیدگاه جامع او در پژوهش‌های آینده شد.

مارکرام فعالیت پژوهشی خود را در دانشگاه کیپ تاون آغاز کرد و در زمینه مدولاسیون شیمیایی مغز و نورون‌های پل مغزی به نتایج ارزشمندی دست یافت. سپس برای ادامه تحصیل به مؤسسه علوم وایزمن در اسرائیل رفت و در سال ۱۹۹۱ دکترای نوروبیولوژی خود را دریافت کرد؛ دوره‌ای که مسیر علمی او را به طور بنیادین شکل داد.

در سال ۲۰۰۲، او مؤسسه مغز و ذهن را در EPFL تأسیس کرد تا بستری برای تحقیقات میان‌رشته‌ای در علوم اعصاب فراهم آورد. سه سال بعد، با راه اندازی پروژه «مغز آبی»، گام بلندی در جهت شبیه سازی کامل قشر مغز برداشت و تحولی بزرگ در علوم اعصاب محاسباتی رقم زد و رویای بزرگ مارکرام شکل گرفت.

امروزه هنری مارکرام به عنوان استاد علوم اعصاب، مدیر آزمایشگاه میکروسرکیت‌های عصبی و بنیان‌گذار پروژه مغز آبی شناخته می‌شود؛ دانشمندی که مرز میان زیست‌شناسی و فناوری را بازتعریف کرده است.



پروژه مغز آبی

(BLUE BRAIN PROJECT)

پروژه مغز آبی که در می ۲۰۰۵ آغاز و در دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسید، یکی از جاه طلبانه‌ترین تلاش‌های علمی در تاریخ علوم اعصاب محسوب می‌شود. این ابتکار تحقیقاتی سوئیسی در موسسه EPFL، با هدف ساخت بازسازی دیجیتال مغز پستانداران، تلاشی نوآورانه برای درک اصول بنیادین ساختار و عملکرد مغز بود.



هدف و ساختار کلی پروژه

در این مدل، رفتار الکتریکی واقعی نورون‌ها و الگوهای فعالیت شبکه‌ای با دقت بالا بازتولید شد. این شبیه‌سازی، نخستین مدل زیستی واقع گرایانه از قشر مغز پستانداران محسوب می‌شود و مبنایی برای مدل‌سازی مغز انسان در مقیاس بزرگ‌تر فراهم کرده است.

دستآورد مهم دیگر پروژه، کشف ساختارهای چندبعدی در شبکه‌های عصبی بود. در سال ۲۰۱۷ تیم BLUE BRAIN با بهره‌گیری توپولوژی جبری نشان داد شبکه‌های نورونی تا ۱۱ بُعد هندسی امتداد می‌یابند. این یافته ثابت کرد مغز فقط در فضای سه‌بعدی عمل نمی‌کند و درک تازه‌ای از سازمان فضایی و عملکردی ارائه داد و به فهم عمیق‌تر پردازش اطلاعات و حافظه کمک کرد.

سومین دستآورد، ایجاد اطلس جامع سلول‌های عصبی قشر مغز (BLUE BRAIN CELL ATLAS) است. پژوهشگران با ترکیب داده‌های حاصل از میکروسکوپ‌های نوری، ثبت‌های الکتروفیزیولوژیک و داده‌های ژنی (RNA-SEQ)، پایگاه داده‌ای دقیق از انواع نورون‌های مغزی تهیه کردند. این اطلس شامل ویژگی‌های مورفولوژیکی، الکتریکی و مولکولی نورون‌هاست و به عنوان مرجع بین‌المللی برای تحقیقات علوم اعصاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این داده‌ها باعث شده مدل‌های جدید مغز آبی واقع‌گرایانه‌تر و قابل بازتولیدتر باشند.

در بُعد فناوری، تیم پروژه ابزارهای پیشرفته‌ای چون BLUE BRAIN NEXUS و BLUEPYOPT را توسعه داد که اکنون در مراکز تحقیقاتی جهان برای مدل‌سازی و تحلیل داده‌های مغزی به کار می‌روند.

مأموریت اصلی پروژه، استقرار شبیه‌سازی به عنوان رویکردی مکمل در کنار روش‌های تجربی، نظری و بالینی برای فهم مغز تعریف شده بود. هدف این نبود که صرفاً مغز را کپی کنند، بلکه شبیه‌سازی را به عنوان ابزاری برای آزمایش نظریه‌های عملکرد مغزی که از طریق آزمایش‌های بیولوژیکی به تنهایی دشوار یا غیرممکن هستند، مورد استفاده قرار دهند.

این پروژه تحت رهبری هنری مارکرام - که همچنین پروژه مغز انسان اروپایی را راه‌اندازی کرد - و با هم‌مدیری فلیکس شورمان، آدریانا سالواتوره و شان هیل اجرا شد. قلب تکنولوژیکی پروژه، استفاده از ابرکامپیوتر BLUE GENE و نرم‌افزار NEURON مایکل هاینز بود که شبیه‌سازی مدل‌های واقع‌گرایانه زیستی از نورون‌ها و بازسازی تجربی مدل شبکه اتصالات را امکان‌پذیر کرد.

طرح پروژه بر بررسی سازمان چندسطحی مغز، از مولکول‌ها و سلول‌ها تا نواحی کامل، متمرکز بود. آرمان نهایی، درک چگونگی پردازش اطلاعات توسط مدارهای پیچیده مغز و چگونگی ظهور رفتارهای پیچیده از تعاملات نورون‌های منفرد بود.

دستآورد های علمی پروژه

در طول دو دهه فعالیت، این پروژه به چند دستآورد بزرگ و اثرگذار در علوم اعصاب و مدل‌سازی محاسباتی مغز رسیده است.

نخستین و مهم‌ترین دستآورد، شبیه‌سازی ستون نئوکورتیکال مغز موش است. پژوهشگران با استخراج داده‌های دقیق الکتروفیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مولکولی از نورون‌های قشر مغز، موفق شدند شبکه‌ای شامل بیش از ۳۱ هزار نورون و ۳۷ میلیون سیناپس را در نرم‌افزارهای مدل‌سازی عصبی بازسازی کنند.




کاربردهای پزشکی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آینده‌نگرانه پروژه، ایجاد بستری برای درک اختلالات مغزی مانند آلزایمر، پارکینسون، صرع و اوتیسم بود. با ایجاد مدل‌های دقیق از مدارهای مغزی، دانشمندان می‌توانند حالت‌های بیماری را در سطوح سلولی و سیناپسی شبیه‌سازی کنند و بررسی کنند چگونه این شرایط از تغییرات درون شبکه‌های مغز ناشی می‌شوند.

نتیجه‌گیری

هنری مارکرام و پروژه مغز آبی با تبدیل رؤیای شبیه‌سازی مغز به واقعیت، نه تنها انقلابی در روش‌شناسی علوم اعصاب ایجاد کردند، بلکه ثابت کردند که علم با جرأت و همکاری میان‌رشته‌ای می‌تواند درک بشر از پیچیده‌ترین ساختار کیهان را متحول کرده و پایه‌های پزشکی شخصی شده و نسل جدید هوش مصنوعی را بنا نههد.



REFERENCES



NeuroBiom

به این ترتیب، پروژه مغز آبی نه تنها در حوزه علوم اعصاب بلکه در پیشرفت محاسبات زیستی و مهندسی داده‌های عصبی نقش مؤثری ایفا کرده است.

این دستاوردها، پروژه مغز آبی را به زیربنای علمی پروژه گسترده‌تر HUMAN BRAIN PROJECT و گامی بزرگ در مسیر درک مغز انسان و طراحی سامانه‌های هوشمند زیستی بدل کرده‌اند.

چشم‌اندازهای آینده

پروژه مغز انسان اروپایی

پروژه مغز انسان اروپایی (HUMAN BRAIN PROJECT) که از دل پروژه مغز آبی شکل گرفت، با بودجه یک میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و همکاری ۸۰ مؤسسه علمی، تلاشی بزرگ برای درک جامع‌تر مغز انسان بود.

اله‌ها برای هوش مصنوعی

پروژه مغز آبی همچنین پایه‌گذار رویکردهای جدید در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شد. الگوریتم‌ها و روش‌های توسعه یافته در این پروژه، الهام‌بخش نسل جدیدی از سیستم‌های هوشمند بودند که بر اساس اصول بیولوژیکی طراحی شده‌اند و نشان دادند که همکاری میان‌رشته‌ای میان علوم اعصاب، فیزیک، ریاضیات و علوم کامپیوتر می‌تواند به دستاوردهای انقلابی منجر شود.



پروژه ها و یافته ها

فاطمه جوان بخت- دانشجوی پرستاری

پروفسور سمیعی در سال ۱۳۵۰ نخستین دوره‌ی آموزشی جراحی میکروسکوپی را آغاز کرد و در سال ۱۳۵۶ با کمک بنیاد فولکس واگن، اولین آزمایشگاه تمرین جراحی میکروسکوپی آلمان را تأسیس کرد. وی در سال ۱۹۷۹ نخستین دوره‌ی آموزشی جراحی قاعده‌ی جمجمه در جهان را در شهر هانوفر پایه‌گذاری نمود. پروفسور مجید سمیعی در دهه‌ی ۱۹۹۰ یک مرکز خصوصی بین‌المللی علوم اعصاب را که INI نامیده می‌شود، در مرکز شهر هانوفر آلمان تأسیس کرد. این مرکز که طراحی معماری آن برگرفته از شکل مغز است.

وی نفوذ عمیقی بر آموزش تعداد زیادی از جراحان مغز و اعصاب داشته است که امروزه به جراحان برجسته در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. او از سال ۱۹۷۹ اولین دوره آموزشی جراحی قاعده جمجمه را در هانوفر پایه‌گذاری کرد و کمک بزرگی به بیماران مغز و اعصاب کرد.

تأثیرات جهانی و محلی



پروفسور مجید سمیعی

پروفسور مجید سمیعی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۶ در شهر تهران چشم به جهان گشودند.؛ و برای ادامه‌ی تحصیل به آلمان رفتند و در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در شهر ماینتس به تحصیل در رشته‌های زیست‌شناسی و پزشکی پرداختند. او دوره‌ی تخصصی جراحی مغز و اعصاب را زیر نظر کورت شورمن آغاز کرد و سال ۱۳۴۹ یعنی در سن ۳۳ سالگی موفق به دریافت مدرک بورس تخصصی در این رشته از کشور آلمان شد.



NeuroBiom

پروژه ها و یافته ها

وی در طی دوره فارغ التحصیلی خود در MIT، به رمزگشایی مغز یعنی ایده خواندن معنی اصلی از سیگنال های مغز علاقه مند شد. او یک الگوریتم از رابط های مغز و ماشین (BMI) تهیه کرد تا از قابلیت مغز یک میمون که در آن حیوان می خواست مکان نما را بر روی نمایشگر رایانه بگذارد، تعریف کرد. رابط های مغز و کامپیوتر (BCI) حلقه بسته ای را توسعه داده است که حرکات را از فعالیت مغز رمزگشایی می کنند تا عملکرد حرکتی از دست رفته در فلج را بازیابی کنند. در سال ۲۰۱۳ او یک روش رمزگشایی مغز ایجاد کرد که می تواند به طور خودکار کنترل میزان بیهوشی را که برای بیمار تجویز می شود، کنترل کند. همچنین قادر است پی برد که بیمار از لحاظ روحی در چه حالتی قرار دارد و در نهایت می تواند برای درمان بهینه و به موقع افسردگی و اضطراب استفاده شود.

توسعه مفاهیم جدید در رابط های مغز-ماشین، نه فقط برای کمک به افراد با معلولیت حرکتی، بلکه در اختلالات خلقی و روانی، که زمینه گسترده تری دارد. تأثیر در طراحی هوشمند رباتیک، کنترل بیومتریکی احساسات، پژوهش در اعماق درک عصبی و مهندسی عصبی، کمک بزرگی به جامعه میکند. همچنین وی الگویی برای ایرانی که به دنبال ورود به رشته های بین رشته ای (مهندسی + علوم اعصاب) هست.



وی زاده ایران در سن ۱۶ سالگی به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در مهندسی برق و علوم کامپیوتر از دانشگاه MIT گرفت و دکترای خود را در سال ۲۰۱۱ به دست آورد. وی در سال ۲۰۱۲، دکتری فوق تخصص خود را در دانشکده پزشکی هاروارد به اتمام رساند. در سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از مبتکران زیر ۳۵ سال ام آی تی تکنالوجی ریویو و یکی از ده دانشمند برتر ساینس نیوز در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد. وی رئیس الکساندر ای. ساوچوک در مهندسی برق و کامپیوتر و استاد مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی زیست پزشکی و علوم کامپیوتر است.

تأثیرات جهانی و محلی



Neuro Biom

پروژه ها و یافته ها

کار و تحقیقات او بر درمان‌های تعدیل عصبی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های عصبی و روانی، از جمله تکنیک‌های تعدیل عصبی مانند تحریک عمیق مغز (DBS) از طریق کاشت تراشه مغز برای درمان لرزش‌های بیماری پارکینسون، اختلال وسواس فکری-عملی، بیماری آلزایمر، آسیب‌های تروماتیک مغزی، آسیب نخاعی و اعتیاد متمرکز بوده است. تحقیقات اخیر از سال 2020 بر تحریک عمیق مغز برای درمان اعتیاد و همچنین سونوگرافی متمرکز برای درمان لرزش، اعتیاد و بیماری آلزایمر متمرکز شده است. این ایمپلنت‌های کاشته شده نوعی ضربان ساز مغز هستند که میل اعتیاد را در بیماران دچار اعتیاد کم میکند. وی نشان داد که سونوگرافی در ترکیب با درمان انتی‌بادی، حذف پلاک آلزایمر را در عرض 6 ماه، در مقایسه با درمان انتی‌بادی به تنهایی 53 درصد بیشتر افزایش می‌دهد.

این تحقیق برای بهبود زندگی بیماران مبتلا به آلزایمر، اعتیاد، افسردگی، بیماری‌های عصبی و روانی بسیار موثر می‌باشد. حرکت درمان به سمت درمان غیر تهاجمی برای بیماران عصبی بسیار موثر بوده است. همچنین ایشان الگویی برای محققان ایرانی برای ورود به حوزه‌های پیشرفته نوروفناوری می‌باشند.

تاثیرات جهانی و محلی



دکتر علی رضایی

علیرضا رضایی متولد 1344 جراح مغز و اعصاب و دانشمند علوم اعصاب ایرانی-آمریکایی است. او در حال حاضر به عنوان معاون رئیس علوم اعصاب دانشگاه ویرجینیای غربی و همچنین رئیس اجرایی موسسه علوم اعصاب راکفلر فعالیت می‌کند؛ همچنین وی رئیس سابق کنگره جراحان مغز و اعصاب، انجمن نورومدولاسیون آمریکای شمالی و انجمن جراحی مغز و اعصاب استریوتاکتیک و عملکردی آمریکا است.



REFERENCES



Neuro Biom

اخـبار

و تازه های زیست شناسی

محیا رادمان مهر_ کارشناسی زیست سلولی

مروری بر جدیدترین دستاورد های

حوزه نوروساینس در سال

۲۰۲۵



NEUROSCIENCE
2025

فناوری های جدید در علوم اعصاب (۲۰۲۵)

هوش مصنوعی و تحلیل مغز


امروزه مدل های یادگیری عمیق قادرند بیماری هایی مانند آلزایمر، پارکینسون و حتی افسردگی را در مراحل ابتدایی، با استفاده از اسکن های MRI و EEG شناسایی کنند. این الگوریتم ها تا ۹۵٪ دقت تشخیصی دارند و هم اکنون در مراکز تحقیقاتی آمریکا، ژاپن و ایران در حال آزمایش بالینی هستند.

چاپ زیستی و مهندسی عصبی

در سال ۲۰۲۵ چاپ سه بعدی سلول های عصبی با استفاده از بیوپرینترهای جدید ممکن شده است. این فناوری به بازسازی بخش هایی از نخاع و قشر مغز در مدل های حیوانی کمک کرده است.

ایمپلنت های مغزی نسل جدید

تراشه های مغزی انعطاف پذیر با قابلیت ثبت و تحریک هم زمان نوروها طراحی شده اند که می توانند در درمان فلج حرکتی، نابینایی و صرع به کار روند. این تراشه ها با استفاده از مواد نانویی رسانا ساخته شده اند و ایمنی زیستی بالایی دارند.



Neuro Biom

اخـبار

و تازه های زیست شناسی

مروری بر جدیدترین دستاورد های

حوزه نوروساینس در سال

۵ ۲ ۰ ۲



یافته های برجسته سال اخیر

پایگاه داده EEG کودکان ایرانی

در ایران، مجموعه ای از داده های مغزی کودکان ۶ تا ۱۱ سال منتشر شده است که رفتار شناختی و سیگنال های EEG آن ها را شامل می شود. این داده ها در یکی از مجلات معتبر NATURE منتشر شده و برای بررسی اختلالات یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد. این پروژه یکی از مهم ترین پروژه های نوروساینس در منطقه محسوب می شود.

پیشرفت در درمان بیماری های عصبی

در مراحل آزمایش انسانی، داروی جدیدی با هدف حذف سلول های عصبی پیر توسعه یافته است که می تواند روند زوال عصبی را در بیماران مبتلا به آلزایمر کند کند.

نقشه سه بعدی جدید از مغز انسان

پروژه ای بین المللی در سال ۲۰۲۵ نقشه ای فوق دقیق از اتصالات نورونی مغز ارائه کرده که حدود ۲۰۰ ناحیه جدید عصبی را معرفی کرده است. این نقشه یکی از منابع مرجع پژوهش های آینده خواهد بود.



Neuro Biom

آخر و تازه های زیست شناسی

مروری بر جدیدترین دستاورد های

حوزه نوروساینس در سال

۲۰۲۵



NEUROSCIENCE
2025

چشم اندازهای آینده

رابطه های مغز-ماشین پیشرفته تر

تا سال ۲۰۳۰ انتظار می رود افراد با استفاده از ایمپلنت های غیرتهاجمی بتوانند حرکات اندام مصنوعی یا حتی دستگاه های دیجیتال را تنها با فکر کنترل کنند.



ترمیم مغز با نانوداروها

نانوذرات هوشمند قادر خواهند بود داروهای ضدالتهاب یا ضدپیری را دقیقاً به نورون های هدف برسانند و از تخریب سلول های سالم جلوگیری کنند.

ترکیب نوروساینس با ژن درمانی

پژوهش ها در حال پیشرفت به سمت استفاده از ژن درمانی برای اصلاح نقص های مولکولی در نورون ها هستند؛ این مسیر می تواند انقلابی در درمان بیماری هایی مانند ALS و MS ایجاد کند.

زیست بانک های عصبی و کلان داده ها

ایجاد بانک های داده جهانی از میلیون ها اسکن مغزی همراه با اطلاعات ژنتیکی و تحلیل های EEG در آینده، امکان پیش بینی های دقیق تر و شخصی سازی شده برای سلامت مغز را فراهم می کند.



REFERENCES



NeuroBiom

تایم لاین و اینفوگرافی

در پایان، نگاه را از واژه به تصویر می‌بریم. تایم لاین‌ها و اینفوگرافی‌های این بخش، روایت دیداریِ تکامل مغز، خواب، و رشد عصبی را بازگو می‌کنند. تصویر، زبانی است جهانی؛ و در اینجا، علم به زبانی دیدنی تبدیل می‌شود تا مفاهیم پیچیده، ساده و ماندگار شوند.



تایم لاین چرخه خواب

یک چرخه کامل خواب شامل دو فاز اصلی است: خواب با حرکت غیر سریع

چشم (NREM) و خواب با حرکت سریع چشم (REM) که این دو فاز به صورت

متناوب در طول شب تکرار می‌شوند.


مبینا کاشکی - کارشناسی علوم آزمایشگاهی



نمودار تکاملی (کاهش پیچیدگی سیستم مغزی)

NeuroBiom

کاهش پیچیدگی مغز



تایم لاین تکامل مغز از جنینی تا نوزادی

شمیلا شاطرزاده
کارشناسی بیوتکنولوژی

ماه اول



تشکیل ساختار اولیه

لوله عصبی شکل می‌گیرد.

پیدایش بخش‌های اصلی

مغز اولیه با سه بخش پیش‌مغز، مغز میانی و پس‌مغز آغاز به تشکیل می‌کند.

ماه اول

ماه دوم

ماه دوم



تورم و تمایز

انتهای بالایی لوله اولیه متورم می‌شود و بقیه لوله به نخاع تبدیل می‌گردد.

شروع تولد نورون‌ها

فرآیندهای نورون‌زایی (تولید نورون‌های جدید) و تمایز نورون‌ها آغاز می‌شود.

ماه سوم

ماه سوم



تخصصی شدن مغز

تقسیمات بیشتری در مغز رخ می‌دهد و بخش‌های تخصصی‌تر شکل می‌گیرند.

ماه هفتم

ماه هفتم



ایجاد اتصالات

فرآیندهای آکسون‌زایی (رشد آکسون‌ها) و سیناپتوسنتز (تشکیل سیناپس‌ها) که از بعد از ماه سوم شروع شده، ادامه می‌یابد.

افزایش و مهاجرت نورون‌ها

تعداد نورون‌ها افزایش یافته و به محل‌های مشخص خود مهاجرت می‌کنند.

ماه نهم

ماه نهم



گسترش شبکه‌های عصبی

شبکه‌های عصبی و سیناپسی رشد بیشتری می‌کنند.

شکل‌گیری نهایی

نخاع و ساختارهای مغزی شکل نهایی خود را می‌گیرند.

دوران نوزادی

دوران نوزادی



بهبود عملکرد

عملکرد شبکه‌ها بهبود می‌یابد.

نقش سلول‌های پشتیبان

سلول‌های گلیال که نقش محافظت از مغز و نورون‌ها را دارند، تشکیل می‌شوند.

رشد سریع

مغز و سیناپس‌ها با سرعت بالایی رشد می‌کنند.



NeuroBiom

پیش زمینه

پیش از ظهور مغز، موجودات زنده تنها از طریق سیگنال‌های شیمیایی و الکتریکی ساده با محیط ارتباط داشتند. به مرور، شبکه‌های عصبی ابتدایی شکل گرفتند و زمینه‌ساز پیدایش مغزهای پیچیده‌تر شدند.

موجودات تک سلولی

فاقد مغز یا سیستم عصبی
واکنش به محیط فقط از طریق سیگنال‌های شیمیایی
نمونه‌ها: باکتری‌ها، تک‌یاخته‌ها

موجودات فاقد مغز

ظهور موجوداتی مانند اسفنج‌ها و لوله‌ورم‌ها
وجود شبکه‌های عصبی پراکنده بدون مغز مرکزی

تایم لاین

تکامل مغز در گونه‌های جانوری

حدیث بهارلو

کارشناس میکروبیولوژی

حدود ۵۰۰ میلیون سال پیش

آغاز سیستم عصبی ابتدایی

در ماهی‌ها و خزندگان اولیه
پیدایش مغزهای سه‌لایه (قدامی، میانی، خلفی)
کنترل عملکردهایی مانند تنفس و حرکت

حدود ۳۰۰ میلیون سال پیش

مغز پرندگان

تکامل مغز در پرندگان مانند طوطی‌ها و کلاغ‌ها
توانایی حل مسئله، یادگیری و تقلید صدا
مغز کوچک‌تر اما بسیار کارآمد و هوشمند

مغز پستانداران

رشد بخش‌های جدید مغز مانند مخ و لوب پیش‌پیشانی
آغاز حافظه، احساسات و یادگیری پیچیده
نمونه‌ها: دلفین، میمون

حدود ۲۳۰ میلیون سال پیش

مغز انسان

بزرگ‌ترین مغز نسبت به اندازه بدن

توسعه‌ی نئوکورتکس و کورتکس پیش‌فرونتال
مسئول تفکر منطقی، برنامه‌ریزی و خلاقیت

Neuro

۱۰۲

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم است. هرگونه استفاده و بازنشر بدون ذکر صاحب امتیاز نشریه و یا کپی برداری بدون خریداری قانونی، سرقت ادبی و هنری محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

NEURO · BIOM
BIOM SCIENTIFIC-STUDENT JOURNAL